NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND, ROSKILDE KOMMUNE, LEJRE KOMMUNE & FREDERIKSSUND KOMMUNE

YNGLENDE FUGLE I ROSKILDE FJORD 2026

NATUROVERVÅGNING

Dato: 2026-10-08



Knopsvaner på Jyllinge Holme, juni 2026

Versions nr: 1.0 Status: 1.udkast Rev. dato: 2026-10-08

Projektnavn:	Overvågning af ynglefugle i Roskilde Fjord 2026
WSP projekt nr.:	22008470, 22008471, 22008472, 22008473
Projektleder:	Erik Mandrup Jacobsen
Udarbejdet af:	Erik Mandrup Jacobsen
Kvalitetssikret af:	Lynne Thorndal
Godkendt af:	Lea Bjerre Schmidt

INDHOLD

1 SAMMENFATNING 5

2 INDLEDNING 6

3 ROSKILDE FJORD 7

3.1 DE BESØGTE LOKALITETER 8

4 METODE 25

4.1 LOGBOG 28

5 RESULTATER 30

5.1 YNGLEFUGLEBESTANDENE 30

5.2 FOKUSARTER 42

5.2.1 Knopsvane 42

5.2.2 Ederfugl 44

5.2.3 Klyde 45

5.2.4 Sølvmåge 47

5.2.5 Stormmåge 49

5.2.6 Hættemåge 50

5.2.7 Sorthovedet måge 51

5.2.8 Fjordterne 51

5.2.9 Havterne 52

5.2.10 Rovterne 53

5.2.11 Andre arter af ynglefugle i fjorden 2026 55

5.3 BREDVIG SØ OG KLYDESØEN 61

5.4 FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDET 65

5.5 IKKE-YNGLENDE ARTER 65

6 LANGTIDSUDVIKLING 68

7 TILTAG TIL GAVN FOR FUGLENE 71

8 REFERENCER 76

Bilag 1: Bestandsudvikling (ynglepar) 1978-2026 på øer og holme.
Bilag 2: Bestandsudvikling (ynglepar) ved Selsø Sø 1970-2026.

1 SAMMENFATNING

Denne rapport om Roskilde Fjords ynglefugle er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem Nationalpark Skjoldungernes Land samt Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner. Optællingsområdet omfatter hele Roskilde Fjord samt Selsø Sø og Bredvig Sø i Frederikssund kommune. Roskilde Fjord er yngle- og rasteplads for en lang række arter af vandfugle, hvoraf flere er fåtallige ynglefugle i Danmark. Fjorden er af samme grund vildtreservat og Natura 2000-område.

Set over hele overvågningsperioden 1978-2026 er der sket en markant tilbagegang i det samlede antal ynglende fugle i fjorden. Udviklingen skyldes især betydelige bestandsnedgange hos nogle af de tidligere mest talrige arter. Hættemågen er eksempelvis gået tilbage fra mere end 15.000 ynglepar i midten af 1980'erne til blot nogle få hundrede ynglepar i 2020'erne. Også stormmåge, knopsvane samt hav- og fjordterne har bidraget væsentligt til den langsigtede nedgang. De vigtigste undtagelser er ederfugl og sølvmåge, som begge har vist en markant bestandsfremgang gennem perioden. I løbet af de seneste 10-12 år har flere arter dog igen været i fremgang, herunder fjordterne, havterne og klyde. Meget tyder på, at naturplejeindsatser samt regulering af ræv og rotter på nøglelokaliteter som Eskilsø og Lilleø har haft en positiv effekt på disse arters ynglebestande.

Fra 2025-2026 kan fremhæves en stor fremgang for knopsvane, ederfugl, hættemåge, fjordterne og havterne samt en generel stigning i antallet af ynglefugle i hele fjorden. Sølvmågebestanden var dog næsten 200 par lavere i 2026 end i året før, og der sås kun meget få æg og unger. I 2026 blev alle registrerede ynglepar af hættemåge, som året før, fundet på Eskilsø, hvor ynglesuccesen igen var særdeles høj. Klyde, vibe, strandskade, stor præstekrave og rødben havde ligeledes et godt yngleår, og langt størstedelen af yngleparrene forekom også her på Eskilsø.

Desuden kan fra 2026 nævnes ynglende spidsand, rovterne og sorthovedet måge på Eskilsø samt ynglende blåhals, 37 par klyder, lille præstekrave og rødrygget tornskade ved Bredvig Sø. Ved Selsø Sø ynglede sorthalset lappedykker, rørhøg, lille præstekrave og blåhals. En samlet oversigt over antallet af ynglepar for udvalgte fuglearter i Roskilde Fjord i 2016-2026 er givet i Tabel 1-1.

Tabel 1-1: Ynglepar af udvalgte arter i Roskilde Fjord 2016-2026 (minus Selsø Sø og Bredvig Sø).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Knopsvane	126	115	163	129	164	111	138	216	158	180	210
Ederfugl	652	778	1.167	823	876	812	645	1.185	879	688	1.157
Strandskade	84	70	83	74	70	94	79	83	92	91	94
Vibe	22	13	18	35	63	51	39	45	49	45	47
Stor præste-	0	0	4	4	12	14	5	9	13	13	11
Rødben	11	8	14	28	41	36	42	51	42	37	38
Klyde	34	71	62	94	100	91	69	74	107	110	93
Sølvmåge	1.505	1.710	1.852	1.766	1.914	1.930	2.031	1.081	1.344	1.050	953
Stormmåge	458	334	288	355	324	207	259	178	274	165	111
Hættemåge	298	260	90	247	116	110	140	425	125	315	466
Fjordterne	26	31	31	41	8	35	32	48	57	98	125
Havterne	40	28	71	43	13	33	23	61	66	31	73
Ynglepar i alt	3.540	3.764	4.253	4.016	4.006	3.807	3.700	3.702	3.414	3.044	3.609

2 INDLEDNING

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste naturområder. Fjorden er yngle- og rasteplads for en lang række arter af vandfugle, hvoraf flere er fåtallige ynglefugle i Danmark. Fjorden er af samme grund vildtreservat og er desuden udpeget som internationalt beskyttet Natura 2000-område.

Fugletællingerne, som sammenfattes i denne rapport, er en videreførelse af et arbejde, der har stået på gennem flere årtier og har involveret mange forskellige aktører.

I perioden 1978-1981 blev tællingerne gennemført i regi af Fredningsstyrelsen, i 1982-1989 varetog Hovedstadsrådet tællingerne, og i de efterfølgende år (1990-2006) gennemførtes naturovervågningen i regi af Roskilde Amt og enkelte år Frederiksborg Amt. Med amternes nedlæggelse per 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for en række naturforvaltningsopgaver, og de efterfølgende års undersøgelser blev gennemført i kommunalt regi (Jacobsen 2017, WSP 2025).

Siden 2018 har også Nationalpark Skjoldungernes Land deltaget i overvågningen og formidlingen af dens resultater. Nationalparken ligger ved Roskilde og Lejre og omfatter hovedparten af det område, der indgår i overvågningsprogrammet.

Tællingerne i Roskilde Fjord har gennem årene tilvejebragt et solidt datagrundlag, som skiftende myndigheder har anvendt i bl.a. den daglige administration af Naturbeskyttelsesloven, miljøvurderinger, forvaltning af Natura 2000-området m.m.

Der knytter sig desuden betydelige rekreative interesser til Roskilde Fjord, idet fjorden og dens omgivelser i vid udstrækning benyttes til forskellige former for sejlads, fiskeri m.m.

Tællingerne bidrager til at skabe et solidt grundlag for at sikre en hensigtsmæssig balance mellem beskyttelse og benyttelse af fjorden i forbindelse med planlægning og beslutninger om blandt andet byudvikling, rekreative interesser og friluftsaktiviteter.

Som en del af projektet udarbejdes pressemeddelelser og nyhedsbreve. Der er desuden gennem årene gennemført et stort antal offentlige fugle- og naturture, foredrag og andre publikumsarrangementer på forskellige lokaliteter rundt om fjorden.

Årets feltarbejde på øer og holme i Roskilde Fjord er gennemført af Erik Mandrup Jacobsen og Flemming Pagh Jensen fra WSP Danmark A/S samt Erik Steen Jensen og naturvejleder Sam Christensen fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

Tællingerne ved Selsø Sø og Bredvig Sø blev i 2026 foretaget af John og Ulla Munch Hansen, Frederikssund.

Steen Højmark-Jensen takkes for også i 2026 at stille sine fotos til rådighed for rapporten.

3 ROSKILDE FJORD

Roskilde Fjord er et typisk sjællandsk fjordlandskab med talrige snævre løb og små øer og holme. Fjorden blev dannet ved en kombination af istidens smeltevandsaktivitet for over 10.000 år siden og stenalderhavets senere indtrængning. Isen udformede oprindeligt det kuperede terræn og tunneldale, som efterfølgende blev oversvømmet, da havniveauet steg. Siden stenalderen har landet hævet sig med 2-3 meter, og fjordens udstrækning er derved blevet mindre.

Roskilde Fjord er næsten overalt meget lavvandet med vanddybder på mindre end 6 meter. Egentlig vade forekommer dog kun få steder som følge af det meget begrænsede tidevand i fjorden. Langs kysten findes strandenge og rørsumpe. I den lavvandede fjord ligger ca. 30 små øer og holme. Den største - Eskilsø - har bakket morænelandskab, mens de øvrige øer består af strandenge, sand- og stenrev.
Fjorden er raste- og fourageringsområde for et stort antal vandfugle. Antallet af fugle varierer efter årstid og vejrforhold. Området har international betydning for sangsvane, knopsvane, troldand, hvinand, stor skallesluger og blishøne. Herudover ses taffeland, pibeand og gråand hyppigt rastende i fjorden. I vinterhalvåret optræder troldand undertiden i flokke på mere end 20.000 fugle.

I og ved fjorden ruger også arter, som er fåtallige ynglefugle i Danmark. Efter 100 års fravær i Roskilde Fjord yngler havørnen nu igen med adskillige par ved Roskilde Fjord. Nogle år yngler også de på landsplan fåtallige ynglefugle sorthovedet måge og rovterne i fjorden, således også i 2026.

Roskilde Fjord er en del af Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Natura 2000-området består af Habitatområde H199 og Fuglebeskyttelsesområde F107 (Jægerspris Nordskov) og Habitatområde 120 og Fuglebeskyttelsesområde F105 (Roskilde Fjord).

Fuglebeskyttelsesområde F105 omfatter, foruden selve fjorden og en del af de tilstødende strandenge, også Selsø Sø og den mod syd beliggende Kattinge Vig og Kattinge Sø. Ved en justering af de danske fuglebeskyttelsesområders grænser per 1/11 2018 blev Gundsømagle Sø i Roskilde Kommune en del af fuglebeskyttelsesområde F105 Roskilde Fjord. Gundsømagle Sø indgår dog ikke i optællingsområdet for denne rapport.

Grundlaget for fuglebeskyttelsesområderne er Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU, hvilket bl.a. sker ved, at medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne opdateres jævnligt for at leve op til direktivet og miljømålsloven, og Danmark er forpligtiget til at sætte arter og naturtyper på et områdes udpegningsgrundlag, hvis der er tale om væsentlige forekomster.

Med hensyn til ynglefugle er Roskilde Fjord i dag udpeget for at beskytte rørdrum, havørn, rørhøg, klyde, sorthovedet måge, dværgterne, fjordterne, havterne og rødrygget tornskade. Desuden er fjorden udpeget af hensyn til trækfuglene knopsvane, sangsvane, grågås, knarand, skeand, krikand, troldand, hvinand, lille skallesluger, stor skallesluger, havørn og blishøne (Miljøstyrelsen 2023).

I 2024 blev udarbejdet en Natura 2000-handleplan for perioden 2022-2027. Planen skal sikre, at beskyttede arter og naturtyper i Natura 2000-området har en gunstig bevaringsstatus (Frederikssund, Roskilde, Lejre, Halsnæs Kommuner, Miljøstyrelsen 2024).

Miljøministeriet har med virkning fra 1. september 1995 desuden udlagt Roskilde Fjord og Store Kattinge Sø som vildtreservat. Reservatordningen indebærer bl.a., at der i en række kerneområder er forbud mod jagt og hurtig motorbådssejlads. Selsø Sø og omgivende landarealer er udlagt til vildtreservat den 15. juni 1997. Her er der forbud mod jagt og anden færdsel, herunder sejlads.

Af hensyn til rugende fugle blev øer og holme i fjorden fredet i 1985. Fredningen forbyder adgang i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Reservatordningen udvider forbuddet til også at omfatte en 50 meter zone omkring en række øer.

3.1 De besøgte lokaliteter

I foråret 2026 blev der optalt ynglefugle på alle fjordens øer og holme samt området ved Selsø Sø og Bredvig Sø ved Skibby i Frederikssund Kommune. De besøgte lokaliteter vil i det følgende blive kortfattet beskrevet.

For yderligere information om de enkelte øer og holme henvises til f.eks. Roskilde Fjord Portalen (Roskilde Fjord frederikssund1.dk), DOF-basen eller kommunernes og Nationalpark Skjoldungernes Lands hjemmesider.

Figur 3-1 viser beliggenheden af de lokaliteter, der indgik i årets undersøgelse.




Stenø S. i Frederikssund Kommune, juni 2026.



Skovholmene i Lejre kommune, maj 2026.




Lille Ø i Roskilde kommune, juni 2026.



Figur 3-1: Besøgte lokaliteter i Roskilde Fjord 2026. Numrene henviser til gennemgangen i det følgende afsnit.


Lokalitet 01: Hesteholmene (Lejre Kommune)





Beskrivelse:
Hesteholme er en gruppe på tre holme på i alt ca. 3,4 ha med en samlet kystlinje på ca. 1.800 m. Holmene ligger syd for Bognæs i Kattinge Vigs munding. De tre holme er kun adskilt fra Askehoved på Bognæs af et smalt, lavvandet område, hvilket gør, at kreaturer og ræve jævnligt vandrer over på holmene. Vegetationen er domineret af strand-annelgræs, og på de højere beliggende områder af harril-enge. Holmene ligger lige ud for skarv- og fiskehejre-kolonien på Bognæs.


Lokalitet 02: Ringøen (Roskilde Kommune)





Beskrivelse:
Ringøen er en lille ø i Kattinge Vig i Roskilde Kommune. Øen er beliggende midt i vigen mellem Boserup Skov og Bognæs. Øen består af en 1-2 meter høj og 10-50 meter bred, cirkelformet vold, som omslutter en mindre sø. Øen er på ca. 2,3 hektar, hvoraf søen udgør 1,3 ha. Kystlængden er på ca. 700 meter. Nordspidsen ender i et lille rev, mens der i øvrigt er ret dybt rundt om øen.


Lokalitet 03: Sivholm (Lejre Kommune)





Beskrivelse:
Sivholm er en mindre holm på ca. 0,2 ha og med en kystlængde på ca. 300 meter beliggende i bunden af Kattinge Vig, knap 100 meter fra land. Holmen er relativt flad, idet den på det højeste sted er knap en meter. Vegetationen er domineret af tagrør, der dækker hoved-parten af øen. Øen bliver lejlighedsvis oversvømmet under højvande.


Lokalitet 04: Elleore (Roskilde Kommune)





Beskrivelse:
Elleore ligger centralt i Roskilde Fjord, øst for Bognæs og nordvest for Veddelev i Roskilde Kommune. Den samlede kystlængde er ca. 880 meter, og øens samlede areal er ca. 1,5 hektar, hvoraf langt den overvejende del består af strandeng samt, mod øst, et langstrakt sten-rev uden vegetation. Den vestlige del af øen består af en næsten cirkelformet 2-3 meter høj strandvold, der omslutter en lavning, som kun ligger lidt over vandoverfladen.


Lokalitet 05: Blak (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Blak er en lille stenø på blot 0,3 hektar syd for Eskilsø i Frederikssund Kommune. Blak ligger lige sydøst for Vædderholm, som er Eskilsøs lange sydøst tange. Det er en ganske lille holm, men alligevel har den nogle år haft et meget stort antal ynglefugle.

Lokalitet 06: Ægholm (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Ægholm er en lille holm på 0,8 hektar i den vestlige del af Roskilde Bredning, øst for Gershøj, i Frederikssund Kommune. Fra holmen strækker Ægholm Rev, som kun er synligt ved lavvande, sig mod nord næsten helt ind til strandengene Okseholmene. Mellem revets nordende og Okseholmene findes en lille passage gennem revet. Vest for holmen og revet ligger den omkring 1 km^2 store Ægholm Flade med vanddybder under 1 meter, mens der på østsiden er dybt vand.

Lokalitet 07: Langholm Lejre (Lejre Kommune)





Beskrivelse:

Langholm i Lejre Kommune er en langstrakt holm med en længde på ca. 600 m, beliggende øst for Lyndby Strand i Lejre Vig. Holmen udgør ca. 2,2 ha, og har en kystlængde på ca. 1.760 meter. Den sydlige ende af holmen løber ud i et langt, smalt stenrev. Holmen er op til 2-3 meter høj og en mindre skrænt skråner op fra den smalle sandstrand mod et plateau på midten af øen. På plateauet er vegetationen domineret af overdrevsflora som rosen-katost og draphavre. En bestand af stor nælde breder sig langsomt på den centrale del af øen.

Lokalitet 08: Hyldeholm Lejre (Lejre Kommune)






Beskrivelse:

Hyldeholm ligger ca. 200 meter øst for Lyndby Strand i Lejre Vig. Holmen udgør ca. 1,6 ha og har en kystlængde på ca. 600 meter. Holmen er omgivet af en smal stenstrand og har en smal stigning til et højere liggende plateau på op til 3-4 meter over havet. Vegetationen er domineret af draphavre. Der er enkelte hyldebuske på øen.


Lokalitet 09: Skovholmene (Lejre Kommune)





Beskrivelse:
Skovholmene består af fem mindre holme, der ligger i bunden af Borrevejle Vig, som er det inderste af Lejre Vig. Holmene har et samlet areal på ca. 1,1 ha og en kystlængde på ca. 1.100 meter. Holmene hæver sig kun knap en meter over vandoverfladen og har en smal sandbræmme langs kysten. Vegetationen er domineret af draphavre på midten og tagrør langs kanterne. På mindst en af øerne er der en stor bestand af kvan.

Lokalitet 10: Eskilsø (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Eskilsø er med sine ca. 128 hektar (ca. 140 ha inkl. de nærmeste småholme) den største af øerne i Roskilde Fjord. En litorinaskrænt adskiller øens høje morænelandskab fra de flade strandenge. Strandengene på sydkysten gennemskæres af losystemer, som ved lavvande danner vadeflader med rige fourageringsmuligheder for svømmeænder, gæs og vadefugle. På øen findes desuden et større vådområde, Rørmosen, samt enkelte søer (bl.a. Klydesøen) og udtørrede mergelgrave.

Lokalitet 11: Yderste Holm (Roskilde Kommune)






Beskrivelse:

Yderste Holm er en mindre holm beliggende i Jyllinge Holme vest for Jyllinge By i det sydlige fjordløb af Roskilde Fjord. Jyllinge Holme danner en kæde af små øer, der strækker sig fra Lilleø ud for Jyllinge fiskerleje mod vest over Langholm J, Tobaksholm, Flængholm og, længst mod vest, Yderste Holm. Holmen er på ca. 0,8 hektar og har en kystlængde på ca. 480 meter. Vestsiden af holmen er en høj vold, hvor der bagved mod øst er et lavtliggende strandengsområde. Mod nord består kysten af en mindre bugt med en stenet forstrand.

Lokalitet 12: Tobaksholm (Roskilde Kommune)






Beskrivelse:

Tobaksholm er en lille holm i Jyllinge Holme vest for Jyllinge By i det sydlige fjordløb af Roskilde Fjord (se ovenfor). Tobaksholm er på ca. 0,6 ha og har en kystlængde på ca. 480 meter. Den sydøstlige side af holmen er en vold, hvor der bagved mod nordvest er et smalt, lavtliggende strandengsområde.


Lokalitet 13: Flængholm (Roskilde Kommune)





Beskrivelse:
Flængholm er en mindre holm beliggende i Jyllinge Holme vest for Jyllinge By i det sydlige fjordløb af Roskilde Fjord. Jyllinge Holme, som Flængholm er en del af, danner en kæde af små øer, der strækker sig fra Lilleø ud for Jyllinge fiskerleje mod vest over Langholm J, Tobaksholm, Flængholm og Yderste Holm længst mod vest. Flængholm er på ca. 1,2 ha og har en kystlængde på ca. 1.200 meter. Holmen består af en 1-2 meter høj ringformet strandvold, som omslutter en mindre sø.


Lokalitet 14: Våddragerholmene (Roskilde Kommune)





Beskrivelse:
Våddragerholmene består af tre mindre holme vest for Jyllinge Lystbådehavn, beliggende mellem Eskilsø og Jyllinge Holme i det sydlige fjordløb af Roskilde Fjord. Det samlede areal er ca. 0,03 hektar, og kystlinjen omfatter ca. 55 meter. Der er tale om relativt flade holme, der på det højeste sted er knap 1 m over havet, omkranset af et stort areal med spredte sten. Øerne overskylles ved højvande.


Lokalitet 15: Lilleø (Roskilde Kommune)





Beskrivelse:
Lilleø er den største holm i Jyllinge Holme beliggende vest for Jyllinge By i det sydlige fjordløb af Roskilde Fjord. Øen er på ca. 11 ha med en kystlængde på ca. 1.700 meter. Dens højeste punkt er på 8 meter. Mod vest er øen lang og flad, mens der mod øst rejser sig en langstrakt bakke. Neden for bakken findes en mindre dam. Øen afgræsses af får.


Lokalitet 16: Langholm Jyllinge (Roskilde Kommune)





Beskrivelse:
Langholmene ved Jyllinge er beliggende vest for Lilleø i det sydlige fjordløb af Roskilde Fjord i Roskilde Kommune. Langholm J er den største af Langholmene med et areal på ca. 0,6 hektar, og en samlet kystlængde på ca. 700 meter. Holmene er 1-2 meter høje.


Lokaltet 17: Kølholm (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Kølholm er en langstrakt holm syd for Tørslev Hage i Frederikssund Kommune. Det er en markant 14 meter høj bakke på sydenden af holmen, der har givet øen dens navn. En lignende bakke på nordenden blev bortgravet, og materialerne fra den blev benyttet ved bygningen af Kalvøen og jernbanedæmningen, som tidligere førte hornsherredbanen over fjorden. Geologisk er Kølholm en del af Skuldelev Ås formationen.


Lokalitet 18: Gadekærsholmen (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Gadekærsholmen er en lille (0,7 hektar), græsklædt og meget kystnær holm med en lille strandsø i Frederikssund Kommune mellem Lille Rørbæk og Skuldelev Strand.

Lokalitet 19: Peberholmen (Frederikssund Kommune)






Beskrivelse:

Peberholmen er en lille (0,2 hektar) ø i Frederikssund Kommune nordøst for Skuldelev Strand. Der er et benyttet sommerhus på øen, der i øvrigt næsten er 100% beplantet med buske og træer. Bortset fra nogle almindelige arter småfugle som solsort, grønirisk mv. er øen med sin nuværende anvendelse og beplantning de fleste år stort set uden ynglefugle.

Lokalitet 20: Stenø S (Frederikssund Kommune)






Beskrivelse:

Stenø S er en lille (1,1 hektar), græsklædt og meget kystnær holm nord for Tørslev Hage og den nye broforbindelse i Frederikssund Kommune. Bortset fra enkelte småfugle, herunder engpiber, er øen de fleste år uden ynglende fugle.


Lokalitet 21: Stenø N (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Stenø N er en langstrakt og kystnær ø på 0,5 hektar ud for Græse Bakkeby i Frederikssund Kommune. Bortset fra mindre områder med græs, strand-malurt m.m., består øen stort set af sten.


Lokalitet 22: Øksneholm (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Øksneholm er en relativt stor holm (ca. 16 ha, kystlinje ca. 2.500 meter) i den nordlige del af Roskilde Fjord i Frederikssund Kommune. Holmen er fjordens nordligste. Den er græsklædt og benyttes til kreaturgræsning. Vegetationen består af typisk strandengs og overdrevs-vegetation. Uden for kreaturhegnet findes en smal stribe med bl.a. strand-malurt. Længst mod nord ligger en lille holm (Kamilleholm).


Lokaltet 23: Ammesholm (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Ammesholm er en lille (0,5 hektar), langstrakt og kystnært beliggende stenø mellem Frederikssund og Neder Dråby i Frederikssund Kommune.

Lokalitet 24: Hyldeholm Skuldelev (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:
Hyldeholm er en lille (0,6 hektar) holm ud for Skuldelev Strand i Frederikssund Kommune. På øen er placeret 3-4 hytter/sommerhuse. Desuden er øen beplantet med mange indslæbte buske, træer og urter. Eneste områder på øen af interesse for vandfugle er en smal bræmme mod vest og fundamentsøerne for højspændingsmasterne. I rapporten omfatter lokaliteten også to sten- og betonøer med højspændningsmaster henholdsvis umiddelbart syd og øst for Hyldeholm.

Lokalitet 25: Svaleø (Roskilde Kommune)






Beskrivelse:

Svaleø er en mindre ø på ca. 0,7 hektar med en kystlængde på ca. 350 meter beliggende på meget lavt vand i Bløden Vig syd for Risø i den østlige del af Roskilde Bredning. Øen er en lav holm omgivet af stenrev og en mudret og stenet strand.

Lokalitet 26: Selsø Sø (Frederikssund Kommune)






Beskrivelse:

Selsø Sø er en afsnøring af Roskilde Fjord beliggende umiddelbart øst for Skibby i Frederikssund Kommune. Området nord for den gamle Selsø Sø blev naturgenoprettet i 1996-1997. Området omfatter samlet 126 hektar rørskov, fersk eng og lavvandet sø. Området rummer desuden enkelte øer og holme, hvoraf især en stor ø mod syd, ved Selsø Kirke, og en flad holm i det naturgenoprettede område mod nord ved Ventevej, som har stor betydning for ynglende fugle i de fleste år.

Lokalitet 47: Slinken (Lejre Kommune)





Beskrivelse:

Slinken er en lille holm på 0,1 ha og en samlet kystlinje på blot 130 meter. Øen er overvejende bevokset af rød svingel og strandkvik. Øen ligger i den sydvestlige del af Kattinge Vig ca. 350 meter nord for udløbet af Store Kattinge Sø til Roskilde Fjord. Et lavvandet område på blot 50 meters bredde adskiller øen fra strandengene på fastlandet ved Rishøj. Øen afgræsses af og til af heste, der vader over til øen fra strandengene på land.

Lokalitet: 48 Bredvig Sø (Frederikssund Kommune)





Beskrivelse:

Bredvig Sø er et nyt vådområde, der blev etableret af Frederikssund Kommune i 2017/18 for at forbedre vandkvaliteten i Roskilde Fjord. Området består, afhængig af årstid og nedbørsforhold, af ca. 6 hektar lavvandet sø med en lille ø og omkringliggende ekstensivt udnyttede, fugtige lavbundsarealer med opvækst af tagrør, høje urter og enkelte spredte træer og buske. Det nye vådområder ligger centralt placeret mellem Roskilde Fjord i syd og Selsø Sø i nord.

4 METODE

Ynglefugletællingerne på øer og holme i Roskilde Fjord er alle årene gennemført som totaloptællinger i fuglenes yngletid. Det er tilstræbt på de enkelte lokaliteter at vælge den fremgangsmåde, der mindst muligt forstyrrer det lokale fugleliv.

På større øer, f.eks. Eskilsø, Lilleø og Øksneholm, er tællingerne gennemført som en kombination af en gennemgang af potentielle yngleområder og optællinger fra faste observationsposter. Der er her tale om et kvalificeret skøn, da en komplet dækning vil kræve længere tids ophold i ynglekolonierne med markante forstyrrelser og risiko for prædation til følge.

Tællingen ved Selsø Sø og Bredvig Sø gennemføres som en kombination af en gennemgang af området og optællinger fra gode observationspunkter ved Ventevej, Selsø Kirke, Møllekrogen m.m.

På meget små holme har det derimod været muligt på kort tid at foretage egentlige totaloptællinger med stor sikkerhed på tallene.

Fokus har været på fugleregistreringerne, men eventuelle relevante iagttagelser vedrørende forstyrrelser, drift og pleje, evt. spor efter rotter, invasive arter, ræv m.m. på de pågældende lokaliteter er også noteret i forbindelse med tællingerne.

Alle fugle, der skønnedes at være lokale ynglefugle, blev registreret og samtidigt registreredes ikke-ynglende fugle, der rastede eller fouragerede inden for undersøgelsesområdet. Der er ved den endelige bestandsvurdering kun anført ét tal, dvs., at der principielt ikke er skelnet mellem mulige, sikre eller sandsynlige ynglepar.

En oversigt over de artsspecifikke kriterier, der er anvendt til at vurdere antallet af ynglepar for de enkelte arter, er givet i Tabel 4-1.



Optælling på Skovholmene, maj 2026.

Tabel 4-1: Oversigt over grundlag, der er anvendt til at vurdere størrelsen af ynglebestanden for de enkelte arter og artsgrupper.

Art	Vurdering af ynglebestanden
Lappedykker	Rugende fugle, reder med æg, voksne fugle med unger, tydelig parrings-adfærd
Svaner og gæs	Rugende fugle, reder med æg, voksne fugle med unger
Svømmeænder	Rugende fugle, reder med æg, tydelig parringsadfærd, "ventehanner" på eller nær lokaliteten.
Dykænder	Rugende fugle, reder med æg (yngler sent, derfor normalt ingen unger på optællingstidspunktet), tilsyneladende par.
Ederfugl	Rugende fugle, reder med æg, tomme reder med dun fra indeværende år, evt. suppleret med antallet af hunner og "børnehaver" i umiddelbar tilknytning til lokaliteten.
Toppet skallesluger	Antal fugle, evt. reder, voksne fugle med unger.
Vandhøns	Rugende fugle, reder med æg, tydelig parringsadfærd, voksne fugle med unger.
Vadefugle, måger og terner	Antallet af tilstedeværende fugle. Rugende fugle, reder med æg eller unger, ængsteligt kaldende fugle, tydelig parringsadfærd.

For hver af de besøgte lokaliteter er, på baggrund af den pågældende lokalitets fugleliv, foretaget en værdisætning efter de overordnede kriterier sammenfattet i Tabel 4-2.



Øksneholm, juni 2026.

Tabel 4-2: Kriterier anvendt til "værdisætning" af de enkelte fuglelokaliteter i Roskilde Fjord. Kun ét af kriterierne under beskrivelsen behøver at være opfyldt.

Værdi	Beskrivelse
Høj	Større yngleforekomster af havterne, fjordterne eller klyde. Ynglende stormmåge eller hættemåge (> 50 par). > 200 par ynglende vandfugle.
Medium	Mindre (enkelte par) yngleforekomster af terner eller klyder. Ynglende stormmåge eller hættemåge. Mindre bestande af vibe, rødben, stor præstekrave eller strandskade. > 100 par ynglende vandfugle.
Ringe	Ingen eller næsten ingen ynglende vandfugle, og i så fald kun enkelte par af helt almindelige arter.





Øverst: lokalitet af "høj værdi": Eskilsø. Nederst: lokalitet af "ringe værdi": Gadekærsholmen (juni 2026).

4.1 Logbog

Tællingerne på øernes fjorde og holme blev i 2026 gennemført den 31. maj, 1. juni og 2. juni. Ved Selsø Sø og Bredvig Sø blev foretaget flere besøg i perioden april-juli (Tabel 4-3).

Tabel 4-3: Lokaliteter omfattet af overvågningen i 2026. Observatører: EMJ: Erik Mandrup Jacobsen. FPJ: Flemming Pagh Jensen. SAM: Sam Christensen. ESJ: Erik Steen Jensen. MUNCH: John Munch Hansen. UMH: Ulla Muh Hansen. Numrene henviser til lokaliteterne på Figur 3-1.

Nr.	Lokaliteter	Dækket	Kommune	Observatører	Dato
1	Hesteholmene	1978-2026	Lejre	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
2	Ringøen	1978-2026	Roskilde	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
3	Sivholm	1978-2026	Lejre	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
4	Elleore	1978-2026	Roskilde	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
5	Blak	1978-2026	Frederikssund	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
6	Ægholm	1978-2026	Frederikssund	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
7	Langholm L	1978-2026	Lejre	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
8	Hyldeholm Lejre	1978-2026	Lejre	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
9	Skovholmene 1-5	1978-2026	Lejre	EMJ, ESJ, SAM	31-05-2026
10	Eskilsø	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	02-06-2026
11	Yderste Holm	1978-2026	Roskilde	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
12	Tobaksholm	1978-2026	Roskilde	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
13	Flængholm	1978-2026	Roskilde	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
14	Våddragerholmene	1978-2026	Roskilde	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
15	Lilleø	1978-2026	Roskilde	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
16	Langholm J	1978-2026	Roskilde	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
17	Kølholm	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
18	Gadekærsholmen	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
19	Peberholmen	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
20	Stenø S	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
21	Stenø N	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
22	Øksneholm	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
23	Ammesholm	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
24	Hyldeholm Skuldelev	1978-2026	Frederikssund	EMJ, FPJ, ESJ, SAM	01-06-2026
25	Svaleø	1978-2026	Roskilde	EMJ, FPJ, SAM	31-05-2026
26	Selsø Sø	1990-2026	Frederikssund	MUNCH	5 x april -juli 2026
47	Slinken	2011-2026	Lejre	EMJ, FPJ, SAM	31-05-2026
48	Bredvig Sø	2017-2026	Frederikssund	MUNCH	5 x april -juli 2026








Roskilde Fjord, maj og juni 2026. Øverst: Hyldeholm L., Midt: Kølholm. Nederst: Hesteholmene.

5 RESULTATER

5.1 Ynglefuglebestandene

En sammenfatning af årets resultater på de enkelte øer og holme i Roskilde Fjord er givet i Tabel 5-1, hvoraf det fremgår, at der i hele fjorden i 2026 blev registreret i alt 27 forskellige arter af ynglende vandfugle, hvilket er to arter mere end i 2025, hvor hverken spidsand eller sorthovedet måge ynglede i fjorden.

Af hyppighedsfordelingen for de 27 arter af vandfugle, der blev registreret i 2026 (Figur 5-1) og Tabel 5-1 fremgår bl.a., at sølvmåge og ederfugl i 2025 tilsammen udgjorde ca. 58 % af fjordens ynglende vandfugle mod 65% året før. Det kan desuden nævnes at sølvmåge fra at være den hyppigste art i fjorden i 2025 rykkede til en andenplads i 2026, idet ederfugl var den talrigeste ynglefugl i Roskilde Fjord i 2026.



Figur 5-1. Hyppighedsfordeling for ynglende fugle (antal ynglepar af vandfugle) i Roskilde Fjord 2026.

Bestandsudviklingen 1978-2026 på øer og holme dækket i hele perioden, dvs. eksklusiv Selsø Sø samt strandenge og andre lokaliteter, der kun er dækket enkelte år, er vist i bilag 1.

Langtidsudviklingen ved Selsø Sø er vist i bilag 2, og årets resultat på de enkelte holme er vist i Tabel 5-1. Naturforhold, værdisætning m.m. på de enkelte øer og holme er sammenfattet i Tabel 5-2, hvoraf det bl.a. fremgår, at der i 2026 blev fundet spor efter rotter på Eskilsø, Yderste Holme, og Tobaksholm. Dette tyder på, at rotterne de senste to år har været i fremgang, da der i 2024 kun blev fundet spor af rotter på Eskilsø.

Desuden blev der i 2026 fundet mink på Eskilsø (fem dyr reguleret), Hyldeholm (fire dyr reguleret) og Peberholm (et dyr reguleret). Der formodes derudover at være mink i alle havnene rundt fjorden. Forekomst af ræv kunne konstateres på Langholm i Lejre Vig, hvor en ræv blev set under en rottekontrol i marts og på Eskilsø, hvor der har været otte ræve i 2026;

Tre ræve fandt vej til Eskilsø over isen i januar-februar, det ene dyr fandt tilbage, og et par slog sig ned og fik fem hvalpe. Alle ræve på øen blev reguleret inden 1. april, dvs. inden fuglenes yngletid. Desuden er den invasive art rynket rose fundet på enkelte holme.



Ringøen, maj 2026.



Rugende ederfugl på Elleore, maj 2026.



Udsigt fra nordspidsen af Eskilsø mod Jyllinge Holme.



Øksneholm, juni 2026.

Tabel 5-1: Resultater (ynglepar) i 2026 for øer og holme, der er dækket i hele perioden 1978-2026, dvs. eksklusive Selsø Sø. Udpegnings ynglefugle er vist med fed skrift. Desuden er anført de enkelte arters status på Rødlisten (DCE 2025), idet LC = "Livskraftig", VU = "Sårbar", NT = "Næsten Truet", "EN" = "Truet", "CR" = Kritisk Truet.

	01-Hesteholmene	0-2-Ringøen	03-Sivholm	04-Elleore	05-Blak	06-Ægholm	07-Langholm L	08-Hyldeholm Lejre	09-Skovholmene	10-Eskilsø	11-Yderste Holm	12-Tobaksholm	13-Flængholm	14-Våddragerhol-	15-Lilleø	16-Langholm J	17-Kølholm	18-Gadekærshol-	19_Peberholmen	20-Stenø S	21-Stenø N	22-Øksneholm	23-Ammesholm	24-Hyldeholm Skuldelev	25-Svaleø	47-Slinken	2026
Toppet lappedykker (VU)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Gråstrubet lappedykker (LC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lille lappedykker (LC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skarv (LC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Knopsvane (LC)	0	36	2	7	0	1	3	5	29	10	33	15	13	0	5	7	20	0	0	0	0	17	0	3	4	0	210
Grågås (LC)	1	2	5	0	0	0	1	3	11	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Gråand (LC)	0	4	2	3	0	0	1	9	10	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	43
Knarand (LC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Spidsand (EN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pibeand (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krikand (VU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atlingand (VU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skeand (VU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Gravand (VU)	1	0	0	0	0	0	3	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Troldand (NT)	0	2	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Taffeland (VU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ederfugl (NT)	0	67	0	35	27	36	0	31	29	92	32	52	81	0	207	77	277	0	1	0	1	81	0	8	23	0	1.157
Toppet skallesluger (VU)	0	0	0	0	1	0	3	12	2	29	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	55
Rørhøg (LC)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Grønbenet rørhøne (VU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	01-Hesteholmene	0-2-Ringøen	03-Sivholm	04-Elleore	05-Blak	06-Ægholm	07-Langholm L	08-Hyldeholm Lejre	09-Skovholmene	10-Eskilsø	11-Yderste Holm	12-Tobaksholm	13-Flængholm	14-Våddragerhol-	15-Lilleø	16-Langholm J	17-Kølholm	18-Gadekærshol-	19_Peberholmen	20-Stenø S	21-Stenø N	22-Øksneholm	23-Ammesholm	24-Hyldeholm Skuldelev	25-Svaleø	47-Slinken	2026
Blishøne (VU)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Strandskade (LC)	3	1	1	3	0	0	2	4	6	45	0	1	1	0	8	1	2	1	0	0	0	14	0	0	1	0	94
Vibe (VU)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	47
Stor præstekrave (VU)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	11
Dobbeltbekkasin (LC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødben (NT)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	38
Alm. ryle (EN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klyde (VU)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93**
Sorthovedet måge (VU)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Svartbag (LC)	0	1	0	1	0	2	0	1	1	4	1	0	1	1	3	1	2	0	0	0	0	4	0	1	1	0	25
Sildemåge (LC)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
Sølvmåge (LC)	0	65	0	75	0	0	20	75	75	75	25	10	40	0	75	12	75	0	1	0	0	300	0	0	30	0	953
Stormmåge (LC)	0	0	0	5	0	0	1	0	0	31	3	0	10	0	10	4	5	0	0	0	2	35	0	2	3	0	111
Hættemåge (EN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466
Rovterne (CR)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Splitterne (LC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjordterne (NT)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**0**	**0**	**0**	**1**	**125**
Havterne (VU)	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**
Dværgterne (VU)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum	9	179	10	132	28	39	35	145	182	1050	97	78	150	2	366	105	383	2	2	0	3	526	5	15	64	2	3.609
Rotter (0 = Nej/ved ikke, 1 = Ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Tabel 5-2: Værdisætning af lokaliteterne og sammenfatning af naturforhold m.m. på de enkelte øer og holme i 2026 jf. kriterierne i Tabel 4-2, hvor der skelnes mellem Ringe, Medium eller Høj. Problemstillingerne med rotter og forstyrrelser gælder principielt alle øer og holme, men adresseres nedenfor specifikt på de lokaliteter, hvor der erfaringsmæssigt er eller har været problemer med dette. For alle lokaliteter skal det fremhæves, at kommunerne, Jagtforeningen Jyllinge Holme og Nationalpark Skjoldungernes Land, alle årene 2018-2026 har gjort en ekstra indsats for at bekæmpe rotter, ræv og de senere år også mink.

Nr.	Lokalitet	Aktuel (2026) værdi for ynglefugle	Nuværende drift	Trusler	Plejebehov m.m.	Rotter 2026
01	Hesteholmene	Ringe	Kreaturer (kommer over fra Bognæs)	Forstyrrelser fra færdsel. Ræv og andre prædatorer, løse hunde.	Fortsat afgræsning af hensyn til almindelige arter af vadefugle, samt ynglende engfugle som gul vipstjert, engpiber, vibe og rødben. Der er ikke fundet spor efter rotter på lokaliteten, men da holmene i perioder er landfaste, er lejlighedsvis forekomster af rotter, mink, ræv m.m. sandsynlige.	Nej
02	Ringøen	Medium (> 100 par vandfugle)	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel.	Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april. Tidligere stor hættemågekoloni og fjordterner bør kunne etablere sig igen. Der blev i 2021 fundet rottehuller, hvoraf nogle sandsynligvis var aktive, og i januar 2021 blev rotter filmet med en drone. Sandsynligvis pga. højvande har Ringøen sikkert været rottefri fra 2022 og de efterfølgende år.	Nej
03	Sivholm	Ringe	Ingen	Ingen kendte trusler.	Pleje ikke relevant. Pga. ynglende hættemåger var værdien i 2019 sat til "Medium", men vurderes at være "Ringe" i 2020-2026 på grund af mågernes fravær disse år.	Nej
04	Elleore	Medium (> 100 par vandfugle, havterne og stormmåge i 2026)	Ingen	Forstyrrelser fra surfere og kajakroere går sandsynligt jævnligt i land på øen, hvilket er set ved tællingerne i 2019 og 2020 men ikke efterfølgende. Potentielt rotter.	Målrettet information har reduceret risikoen for forstyrrelser. Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april.	Nej
05	Blak	Ringe, I 2026 dog 27 par ederfugle	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel. Efter kraftige storme er øen stort set vegetationsløs, hvilket medfører stærkt forringede muligheder for, at de ynglende fugle kan finde skjul til rederne.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser.	Nej

Nr.	Lokalitet	Aktuel (2026) værdi for ynglefugle	Nuværende drift	Trusler	Plejebehov m.m.	Rotter 2026
				Ederfugl, knopsvane og svartbag ynglede dog i 2025.		
06	Ægholm	Ringe (i 2026 dog 36 par ederfugle)	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel. Øen er nu næsten vegetationsløs formentlig på grund af forhøjet vandstand og øget erosion på grund af øget frekvens af højvander og vinterstorme. Derfor kun få redesteder. Stormmåge har tidligere ynglet.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser.	Nej
07	Langholm Lejre	Ringe (pga. prædation fra ræv og næsten ingen ynglefugle i 2026. I 2025 medium Pga. > 100 par vandfugle og stormmåge)	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel. Fra en nærtliggende feriekoloni på Lyndby Strand sker undertiden sejlads med kajakker/kanoer til Langholm i fuglenes yngletid. Potentielt rotter. Ræv i 2026.	Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april. Mulige forstyrrelser kan reduceres ved målrettet information. Fokus på, om der fortsat forekommer ræv på øen. Ræve på øen i 2026.	Nej
08	Hyldeholm Lejre	Medium (> 100 par vandfugle. Desuden troldand i 2026)	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel. Fra en nærtliggende feriekoloni på Lyndby Strand sker undertiden sejlads med kajakker/kanoer til Hyldeholm i fuglenes yngletid. Potentielt rotter	Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april. Øen rummer en del rottehuller, der dog sandsynligvis ikke længere er aktive. Mulige forstyrrelser kan reduceres ved målrettet information.	Nej
09	Skovholmene	Medium (> 100 par vandfugle Stormmåge og havterne (tre par) i 2026)	Ingen	Forstyrrelse fra færdsel. Potentielt rotter.	Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april. Der har tidligere været registreret bjørneklo på den nordligste ø, dog ikke i 2026.	Nej
10	Eskilsø	Høj (Klyde, havterne, fjordterne, rovterne, sorthovedet måge> 200 par	Ca. 50 kreaturer og/eller får. Etablering af permanent	Ræv Rotter Trampeskader fra kreaturer	Fortsat indsats for at holde øen ræve- og minkfri. Ræve reguleringen på Eskilsø udføres af Jagtforeningen Jyllinge Holme, der de seneste 10 år har skudt og fanget mindst 35 ræve. I 2017 erklæredes øen rævefri, og der har siden kun været enkelte	Ja

Nr.	Lokalitet	Aktuel (2026) værdi for ynglefugle	Nuværende drift	Trusler	Plejebehov m.m.	Rotter 2026
		vandfugle og 466 par hættemåger i 2026)	vanddækket eng mellem Rørmosen og diget syd for m.m. Højere vandstand og permanent vanddække i Klydesøen. Vedvarende regulering af ræve, bekæmpelse af rotter. Planer om afgræsning hele eller hovedparten af året.		strejfende ræve på øen. I foråret 2021 blev endnu en ræv skudt på Eskilsø af formanden Hans Aare fra Jyllinge Holme Jagtforening. Forud var gået mange timers (et skøn er ca. 150 timer) frivillig indsats af medlemmer fra foreningen. I alt er i perioden 2014-2026 nedlagt 45 ræve på Eskilsø. I 2026 blev syv ræve nedlagt inden 1. april. Specielt i perioden oktober – marts vedligeholder Jagtforeningen Jyllinge Holme rævefælde, vildtkamera, tjekker kunstgrav og ser efter andre spor af ræv, mink eller rotter. Reguleringen skal, som hidtil, foretages med størst mulig hensyntagen til øens øvrige dyreliv. Der anvendes fortrinsvis anstandsjagt fra skjul samt rævefælder, der er meget effektive overfor rævehvalpe. Det er desuden afgørende vigtigt at fortsætte afgræsning af strandengene og om nødvendigt justere den ved f.eks. at frahegne særligt følsomme områder i de særligt følsomme perioder (maj-juni). Der blev også i 2026 fundet rotter på Eskilsø, og der blev desuden fanget fem mink. Øen tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april. Ved forekomst af rotter bekæmper kommunen dem i samarbejde med beboer. Ejer af Eskilsø, Struckmanns Naturfredningsfond, gennemfører i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land i perioden 2024-26 et projekt for at fremme naturværdierne på øen med udgangspunkt i faglig rapport fra Aarhus Universitet/DCE: *Basisundersøgelse til evidensbaseret naturforvaltning på Eskilsø*	

Nr.	Lokalitet	Aktuel (2026) værdi for ynglefugle	Nuværende drift	Trusler	Plejebehov m.m.	Rotter 2026
					(år 2023). Projektet støttes bl.a. af Den Danske Naturfond med 1,42 mio. kr.	
11	Yderste Holm	Medium (> 100 par vandfugle, kun 97 i 2026, stormmåge i 2026)	Regulering af sølvmåger v/Jagtforeningen Jyllinge Holme	Forstyrrelser fra færdsel. Potentielt rotter.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser. Øen bør senest i januar-februar, eller så snart isen i fjorden er forsvundet, tjekkes for forekomst af rotter. Ved en eventuel forekomst bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april.	Ja
12	Tobaksholm	Ringe (dog ynglende, knopsvane, ederfugl, strandskade og sølvmåge i 2026)	Regulering af sølvmåger v/Jagtforeningen Jyllinge Holme	Forstyrrelser fra færdsel. Potentielt rotter.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser. Øen bør senest i januar-februar, eller så snart isen i fjorden er forsvundet, tjekkes for forekomst af rotter. Ved en eventuel forekomst bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april.	Ja
13	Flængholm	Medium (> 100 par vandfugle, 10 par stormmåger og to par klyder i 2026)	Regulering af sølvmåger v/Jagtforeningen Jyllinge Holme	Forstyrrelser fra færdsel. Potentielt rotter.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser. Øen bør senest i januar-februar, eller så snart isen i fjorden er forsvundet, tjekkes for forekomst af rotter. Ved en eventuel forekomst bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april.	Nej
14	Våddragerholmene	Ringe	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel. Stigende vandstand og hyppigere overskylning ved højvande.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser.	Nej
15	Lilleø	Høj (Fjordterne, havterne, stormmåge og klyde i 2026, > 200 par vandfugle)	Fåreafgræsning Regulering af sølvmåger v/Jagtforeningen Jyllinge Holme	Forstyrrelser fra færdsel. Rotter. Muligvis nogle år overskylning af havternereder. Nogle år tilgroning med horsetidsel og tornet tidsel.	På baggrund af besigtigelser af bl.a. Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde Kommune, Naturstyrelsen m.fl. vurderes det, at Lilleø nu er rottefri. Rotterne overvåges og bekæmpes om nødvendigt fortsat fortløbende, og der foretages forsøg med forskellige metoder til overvågning og bekæmpelse. Indsatsen har tilsyneladende virket, og i 2022-2025 kan noteres markante fremgange for flere arter af jordrugende fugle. Bekæmpelse bør foretages, inden ynglefuglene ankommer i marts-april.	Nej

Nr.	Lokalitet	Aktuel (2026) værdi for ynglefugle	Nuværende drift	Trusler	Plejebehov m.m.	Rotter 2026
16	Langholm J	Medium (> 100 par vandfugle, Stormmåge og fjordterne i 2026)	Regulering af sølvmåger v/Jagtforeningen Jyllinge Holme	Forstyrrelser fra færdsel. Rotter. Erosion af nordøst- og nordspids.	Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april.	Nej
17	Kølholm	Høj (> 200 par vandfugle, stormmåge i 2026). Vigtigste holm for ederfugl	Ingen	Nogle år rotter. Erosion under vinterstorme.	Evt. rottebekæmpelse gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april. Der blev i 2021-2024 ikke fundet tegn på levende rotter, men i 2025 var der atter tegn på rotter på øen. I 2021 fandtes mindst 10 ihjelbidte ederfugle hunner, der endnu lå på reden – med stor sandsynlighed prædation fra havørn. Der blev ikke fundet spor af rotter på øen i 2026.	Nej
18	Gadekærsholmen	Ringe (Dog strandskade og stor præstekrave i 2026)	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel. Ræv, rotter og mink pga. kystnærhed.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser. Øen bør årligt tjekkes for tilstedeværelse af ræv, rotter og mink, og bekæmpelse bør i givet fald iværksættes.	Nej
19	Peberholmen	Ringe (meget få par af almindelige arter i 2026)	Ingen. Benyttet sommerhus på øen.	Forstyrrelser fra færdsel m.m. ved sommerhus.	Der vokser fortsat rynket rose på det meste af øen. Disse er sandsynligvis plantet bevidst men bør fjernes og erstattes af naturligt hjemmehørende vegetation. Anden pleje ikke relevant. Almindelige småfugle som tornsanger og blåmejse yngler på øen. Der blev fundet spor efter mink på øen i 2025, og et dyr blev reguleret i 2026.	Nej
20	Stenø S	Ringe (kun engpiber i 2026)	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser. Som øen henligger nu, er den uden særlig ornitologisk værdi. Hvis der etableres en samlet afgræsning af strandengene omkring Tørslev Hage, bør Søndre Stenø inddrages. Rynket rose er fundet på holmen 2019-2026.	Nej
21	Stenø N	Ringe-medium (to par stormmåger i 2026)	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser. Pleje ikke relevant.	Nej
22	Øksneholm	Høj (> 200 par vandfugle.	Kreaturafgræsning	Forstyrrelser fra færdsel. Ræv, mink og rotter.	Fortsat afgræsning vigtigt. Øen bør fortsat årligt tjekkes for tilstedeværelse af ræv, mink og rotter. Ræv er regelmæssigt registreret på øen, og der sås ved tællingen i 2021 huller efter rotter, hvoraf nogle	Nej

Nr.	Lokalitet	Aktuel (2026) værdi for ynglefugle	Nuværende drift	Trusler	Plejebehov m.m.	Rotter 2026
		Klyde, havterne, fjordterne, stormmåge i 2026)			sandsynligvis var aktive. En rotte blev filmet med drone i februar 2021 og igen tidligt forår 2022. Ingen rotter i 2026.	
23	Ammesholm	Ringe (Ingen ynglende vandfugle i 2026)	Ingen	Forstyrrelser fra færdsel. Manglende vegetation pga. øget højvande. Øen er ofte overskyllet ved selv middelstort højvande og også i fuglenes ynglетid	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser.	Nej
24	Hyldeholm Skuldelev	Ringe-medium (stormmåge yngler næsten årligt på øen og på soklerne til højspændingsmasterne, i 2026 dog kun to par)	Ingen, 3-4 sommerhuse på øen.	Forstyrrelser fra færdsel. Oversvømmelse under vinterstorme. Øens mangeårige anvendelse som naturistfristed er ikke foreneligt med et større antal ynglende vandfugle. Rotter har tidligere fået en bestand af toppet skallesluger til at forsvinde.	Målrettet information kan reducere omfanget af forstyrrelser. Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april. Rynket rose er tidligere fundet på øen; 4 mink blev reguleret på øen i 2026.	Nej
25	Svaleø	Ringe (enkelte år, senest i 2014, dog > 100 par vandfugle; et par skarver i 2026)	Ingen	Aktuelt rottefri, men rotter er en potentiel trussel. Nogle år ræve.	Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april.	Nej
26	Selsø Sø	Høj (>200 par vandfugle, sorthalset lappedykker, fjordterne, klyde, lille præstekrave og rørhøg i 2026)	Kreaturafgræsning, sikring af øer, kratrydning, rørskær, regulering af færdsel.	Tilgroning. Mink.	Fortsættelse af afgræsning m.m. Græsningstrykket har de senere år været noget lavt, og engene ved Ventevej under begyndende tilgroning. Vedvarende bekæmpelse af mink.	Vides ikke men er sandsynligt
47	Slinken	Ringe-medium (et par fjordterner og rødben, ellers ingen vandfugle i 2026)	Afgræsses tidvis af heste, der vader over fra land.	Forstyrrelser fra færdsel. Potentielt mink, ræv og rotter pga. kystnær beliggenhed.	Tjekkes for rotter senest i januar-februar. Ved evt. forekomst af rotter bør bekæmpelse iværksættes så hurtigt som muligt og gennemføres, inden ynglefuglene ankommer i marts-april. Mink bør bekæmpes i nærområdet.	Nej

Nr.	Lokalitet	Aktuel (2026) værdi for ynglefugle	Nuværende drift	Trusler	Plejebehov m.m.	Rotter 2026
48	Bredvig Sø	Høj (klyde, lille præstekrave, rødrygget tornskade og blåhals i 2026. Ynglefor-søg af hættemåge i 2025, men ingen yng-lende i 2026)	Ingen	Tilgroning, prædation pga. øens lejlig-hedsvise landfasthed.	Græsning eller anden pleje af randarealer. Der er stærk tilgro-ning med bl.a. pilevækst, som bør ryddes, hvis området ikke skal gro helt til. Muligheder for at gøre øen i vådområdet ræve-sikkert ved at hæve vandstanden bør undersøges. Hættemå-gerne tog, med mindst 250 par i 2021 "området til sig", og i 2022 ynglede mindst 450 par. En del er sandsynligvis "tilflyt-tere" fra Selsø Sø, hvor antallet er gået tilbage. I 2026 ynglede ingen hættemåger, men derimod hele 47 par klyder, hvorfor lokalitetens værdi 2025-2026 er øget fra "medium" til "høj".	Vides ikke men er sandsynligt

5.2 Fokusarter

5.2.1 Knopsvane

Ynglebestand i Roskilde Fjord: 210 par (plus 22 par ved Bredvig Sø og Selsø Sø)

Knopsvanen ynglede for første gang i Roskilde Fjord i 1954, da en af landets første kolonier blev etableret på Sivholm (7 par i 1958, voksende til 18 par i 1961), (Bregnballe et al. in prep.).

Knopsvanen ynglede i 2026 med 210 par, hvilket er en fremgang i forhold til året før (180 par) og lidt over niveauet for de fleste af de foregående ca. 10 år. Dertil kommer yderligere et par ved Bredvig Sø og 21 par ved Selsø Sø.

De vigtigste ynglepladser i 2026 var Ringøen (36 par), Yderste Holm i Jyllinge Holme (33 par) og Skovholmene (29 par).

Trods en tendens til fremgang de seneste år har bestanden set over hele overvågningsperioden været i tilbagegang i Roskilde Fjord. Øget færdsel på vandfladen og ringe ynglesucces er nævnt som mulige årsager (Bregnballe et al. in prep.). Knopsvane står opført på Rødlisten (DCE 2026) som "LC" = "Livskraftig", dvs. ikke truet.

En oversigt over bestandsudviklingen for kystfuglene på 108 øer og 24 kystlokaliteter omkring Fyn viser ligeledes en markant tilbagegang fra 1974-76 til 2021-22 (Andersen & Bisschop-Larsen 2023).

Knopsvane "79EA", der blev ringmærket i maj 2013 og dermed var mere end 12 år gammel, da den blev set i 2025, blev for første gang i en lang årrække ikke observeret ved Elleore under årets tællinger. Vinteren 2025/2026 var usædvanlig lang og kold, og store dele af Roskilde Fjord var i lange perioder dækket af is. Det er derfor sandsynligt, at "79EA" ikke har overlevet den kolde vinter.



Knopsvanen "79EA" på Elleore i maj 2023.





Knopsvaner på Kølholm, juni 2026.

5.2.2 Ederfugl

Ynglebestand Roskilde Fjord: 1.157 par

Ederfugl indfandt sig som ynglefugl i Roskilde Fjord i midten af 1980erne med ganske få rugende hunner, men i dag er bestanden vokset til mellem 700-1200 ynglende hunner (Bregnballe et al. in prep).

Arten har i en årrække været i markant fremgang i Roskilde Fjord og yngler nu på de fleste øer og holme i fjorden, herunder også på Eskilsø. Bestanden i Roskilde Fjord i 2026 er vurderet til 1.157 par, hvilket er en markant fremgang i forhold til 2025 (688 par). Fremgangen betyder, at ederfuglen i 2026 var den mest almindelige ynglefugl i Roskilde Fjord.

Det skal dog bemærkes, at tallene for ederfugl er forbundet med usikkerhed, bl.a. fordi ikke alle reder findes, da dette ville medføre en betydelig forstyrrelse af såvel ederfugle som andre ynglefugle på de enkelte øer og holme. Desuden udføres tællingerne generelt ret sent i forhold til det tidspunkt, hvor det er optimalt for netop denne art (Bregnballe et al. in prep.).

Sammenligninger med grundigere optællinger foretaget af Jagtforeningen Jyllinge Holme i forbindelse med oliering af mågeæg på Jyllinge Holme kunne tyde på, at reder især på de større holme overses, selvom også forskelle i kriterier for opgørelse af antal ynglepar kan spille en rolle.

Dertil kommer, at ederfugl først er kønsmoden i en alder af 3-4 år, og at mange af de ederfugle, der ses i Roskilde Fjord, derfor ikke er ynglefugle. Det er dog givet, at bestanden af ederfugl i Roskilde Fjord er gået meget markant frem set over hele overvågningsperioden. Siden slutningen af 1990'erne er bestanden i fjorden mere end tidoblet. En så markant fremgang kan skyldes, at arten i perioden har været under indvandring til fjorden (Bregnballe et al. in prep.).

Nedgangen i bestanden de senere år skyldes sandsynligvis en kombination af flere faktorer. De senere år, således også i 2026 sås flere tilfælde af ederfugle hunner, der var blevet præderet af havørne. Rester af sådanne hunner er fundet på bl.a. Øksneholm, Langholm, Skovholmene og Hyldeholm ved Lejre samt Lilleø. Derudover er der på nogle øer en meget kraftig nedgræsning af vegetationen fra et stigende antal bramgæs, hvilket kan gøre det vanskeligere for ederfuglene at yngle skjult, hvilket yderligere øger deres sårbarhed overfor prædation.

Flest ynglefugle fandtes i 2026 på Kølholm (277par), Lilleø (207 par), Eskilsø (92 par) Flængholm (81 par) og Øksneholm (81 par).

Ederfugl er i tilbagegang i Danmark og står nu opført på Rødlisten (DCE 2025) som "NT" = "Næsten Truet", og per 1. juli 2022 blev ederfugl fredet i de fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget. Ederfugle hanner må jages udenfor fuglebeskyttelsesområderne 1. oktober til 31. januar (Jægerforbundet 2022).

En tilsvarende langsigtet fremgang fra 1974-76 til 2021-22 ses på kystlokaliteterne omkring Fyn, hvor arten også til og med 2022 var den næst talrigeste ynglefugl efter sølvmågen i det optalte område (Andersen & Bisschop-Larsen, 2023).



Rugende ederfugl på Flængholm, juni 2026.



Ederfugl nedlagt af ung havørn på Lilleø, maj 2025. Også i 2026 blev sådanne fugle fundet.

5.2.3 Klyde

Ynglebestand Roskilde Fjord: 93 ynglepar (plus 15 par Selsø Sø og 47 par ved Bredvig Sø)

I 1980erne og ’90erne ynglede der årligt 80-140 par Klyder i Roskilde Fjord. Efter midten af 1990erne gik fjordens ynglebestand imidlertid tilbage og i 2009 ynglede der blot 17 par. I de følgende år steg

antallet hurtigt igen: Først til 30-60 par og efter 2016 til 60-110 par. Den seneste stigning skyldes næsten udelukkende en markant fremgang på Eskilsø.

Den samlede bestand i selve fjorden i 2026 var 93 ynglepar, hvilket er lidt mindre end i 2025 (110 par). Op til 52 fugle rastede i april ved Selsø Sø, men blot otte par ynglede i 2026. Dette er en stor tilbagegang i forhold til 2024, hvor 47 par ynglede, men lidt mere end de blot tre par, der ynglede i 2025. Ved Bredvig Sø indfandt op til 60 fugle sig i maj måned, og det vurderes, at 47 par ynglede, hvilket er det højeste antal ynglepar hidtil i det endnu relativt nye vådområde.

Med 79 par (2025: 78 par) er Eskilsø også i 2026 langt den vigtigste lokalitet i fjorden for arten. En medvirkende forklaring på klydens succes på Eskilsø (Figur 5-2) kan være, at Jagtforeningen Jyllinge Holme de seneste mange vintre har reguleret ræv på øen. På Jyllinge Holme (Flængholm, Langholm og Lilleø) ynglede seks par, og endnu otte par ynglede på Øksneholm.

Klyden er særdeles mobil i sit valg af yngleplads og skifter mellem lokaliteterne fra år til år og i løbet af den enkelte ynglesæson, alt efter fugtighedsforhold, tilstedeværelse af prædatorer m.m. For eksempel har tællingerne vist, at der især sker en udveksling af fugle mellem Selsø Sø, Bredvig Sø og Eskilsø og sikkert også mellem andre lokaliteter. De seneste ca. 10 år har der været en tendens til, at fuglene samles i færre og større kolonier, som nævnt med Eskilsø som langt den vigtigste yngleplads.

Trods store udsving på de enkelte lokaliteter mellem 2025 og 2026, er den samlede bestand i hele det optalte område øget fra 138 par i 2025 til 155 ynglepar i 2026).

Klyden står opført på Rødlisten (2019) som ”VU” = ”Sårbar”.



Klyde ynglede i 2026 med 138 par i hele det optalte område, hvilket er det samme som i 2025. Med 79 par er Eskilsø også i 2026 langt den vigtigste lokalitet i fjorden for arten. Foto Steen Højmark-Jensen.



Figur 5-2. Bestandsudvikling for klyde på Eskilsø.

5.2.4 Sølvmåge

Ynglebestand i Roskilde Fjord: 953 par

Sølvmågen er en vidt udbredt ynglefugl i Roskilde Fjord og ynglede i 2026 på 15 af øerne i optællingsområdet. Over hele perioden har sølvmågen været i markant fremgang i fjorden, men resultatet fra de seneste fire år afviger fra det samlede billede

I 2026 talte bestanden 953 par, hvilket er en markant tilbagegang fra 1.344 par i 2024 og 1.050 par i 2025. Der er en vis usikkerhed forbundet med optællinger af fuglene i de større kolonier, men det er givet, at der de seneste år har været tale om en markant tilbagegang for arten. I 2023-2026 er set færre fugle, reder, æg og unger end de foregående år. Den vurderede ynglebestand, der alene baserer på antallet af tilstedeværende fugle, kan derfor ikke tages som udtryk for, hvor godt arten klarer sig, da det de seneste fire år kun er lykkedes for få par at få unger på vingerne.

Nedlægning af minkfarmene, ringe vandkvalitet samt den lokale regulering af sølvmåger (oliering af æg), der har fundet sted i årevis på Jyllinge Holme, kan spille en rolle.

Der har tidligere været en tendens til, at bestanden på Jyllinge Holme er gået mere tilbage end i resten af fjorden, måske pga. reguleringen, men med nedgangen i 2026 både på Jyllinge Holme og i hele fjorden, er tendensen på de to kurver nu stort set den samme (Figur 5-3).


Den største sølvmågekoloni fandtes også i 2026 på Øksneholm (300 par). På hver af holmene Elleore, Hyldeholm Lejre, Skovholmene, Eskilsø, Lilleø og Kølholm ynglede ca. 75 par.

På øerne og kystlokaliteterne omkring Fyn er sket en fremgang fra 1974-76 til 2021-22 i størrelsesorden 25 % på de optalte lokaliteter. Sølvmågen var den talrigeste art på lokalieterne i 2021-22, hvorimod hættemågen indtog 1. pladsen i 1974-76 (Andersen & Bisschop-Larsen 2023), præcist som tilfældet var det i Roskilde Fjord i overvågningens første år (Bilag 1).

Sølvmågen står opført på Rødlisten (2019) som ”LC” = ”Livskraftig”, dvs. ikke truet.



Sølvmågeunge på Skovholmene, maj 2026.



Figur 5-3. Bestandsudvikling for sølvmåge på Jyllinge Holme og i hele fjorden 2010-2026. Desuden er vist lineære tendenslinjer for de to delområder.

5.2.5 Stormmåge

Ynglebestand i Roskilde Fjord: 111 par (plus et par Selsø Sø)

Stormmågen var, næst efter hættemåge, fjordens hyppigste ynglefugl frem til årtusindeskiftet, men siden er arten gået markant tilbage. De seneste tre år er bestanden faldet fra 274 par i 2024 til henholdsvis 165 og 111 par i 2025 og 2026, hvilket er det laveste antal ynglepar i hele overvågningsperioden. De vigtigste ynglepladser for stormmåge i 2026 var Øksneholm (35 par), Eskilsø (31 par), Lilleø og Flængholm (hver med 10 par).

Arten har desuden ynglet årligt på mastefundamenterne til de højspændingsledninger, der krydser Roskilde Fjord ved Skuldelev, i 2026 dog kun med to par mod 18 par i 2024 og otte par i 2025. Tilbagegangen 2024-2026 skyldes især nedgange i bestandene på Eskilsø og Øksneholm.

Årsagerne til den meget markante og ret pludselige tilbagegang kendes ikke, men arten er de seneste 50 år været i konstant tilbagegang på landsplan (Christensen et al. 2022), hvorfor tilbagegangen i fjorden ikke nødvendigvis skyldes lokale forhold.

Stormmågerne søger i vid udstrækning deres føde udenfor fjorden, og det er muligt at svigtende fødeudbud her kan spille en rolle for tilbagegangen (Bregnballe et al. prep.). Den danske ynglebestand er rødlistevurderet som "LC", dvs. Livskraftig (DCE 2026).

Optællinger på 108 øer og 24 kystlokaliteter omkring Fyn viser, som i Roskilde Fjord, en meget markant tilbagegang for stormmågen fra 1974-76 til 2021-22 (Andersen & Bisschop-Larsen 2023).



Stormmåge – her på Blak, hvor arten senest ynglede i 2024. Arten gik igen markant tilbage i Roskilde Fjord fra 165 par i 2025 til 111 par i 2026. Foto: Pelle Andersen-Harild.

5.2.6 Hættemåge

Ynglebestand i Roskilde Fjord: 466 par (alle på Eskilsø)

Hættemågen var tidligere fjordens almindeligste ynglefugl. Bestanden svingede frem til midten af 90'erne mellem 5.000 og 15.000 par, men siden er der sket en voldsom tilbagegang, som det også er set i resten af landet. De største kolonier har tidligere været på Ringøen, Kølholm, Hyldeholm i Lejre Vig, Skovholmene, Øksneholm og Svaleø. Det er sandsynligt, at den vedvarede tilbagegang i fjorden knytter sig til et fald i adgangen til egnede fødesøgningssteder omkring fjorden (Bregnballe et al in prep.).

Den samlede bestand i fjorden steg i 2026 til 466 ynglepar. Samtlige ynglepar blev registreret på Eskilsø, hvilket også var tilfældet i 2025, hvor bestanden omfattede 315 ynglepar. Det har ikke i hverken 2025 eller 2026 været muligt konkret at vurdere ynglesuccesen, men begge år kunne et stort antal unger ses i kolonien under optællingerne på Eskilsø (se foto nedenfor).

I 2025 blev noteret 150 par ved Selsø Sø, men alt tyder på, at ingen eller kun meget få par her ynglede med succes dette år, og der er ikke i 2026 noteret fugle med yngleadfærd ved hverken Selsø Sø eller Bredvig Sø.

Optællinger på 108 øer og 24 kystlokaliteter omkring Fyn viser, som i Roskilde Fjord, en meget markant tilbagegang for hættemåge fra 1974-76 til 2021-22. I de tidlige år var hættemågen den talrigeste art i det optalte område, men i de sene år havde sølvmågen overtaget pladsen som den talrigeste ynglefugl (Andersen & Bisschop-Larsen 2023).

Der er ikke fra nogen af de tre kommuner eller Nationalpark Skjoldungernes Land dokumenterede ynglefund af hættemåge i 2026 udenfor Roskilde Fjord, heller ikke fra Slotssøen ved Slangerup (Frederikssund Kommune), hvor 50-60 par ynglede i 2025 (DOFbasen 2026).

Den danske ynglebestand er rødlistevurderet som "EN", dvs. Truet (DCE 2026).



Hættemågen ynglede kun på Eskilsø i 2026. Som billedet antyder, var ynglesuccesen (som i 2025) høj dette år.

5.2.7 Sorthovedet måge

Ynglebestand i Roskilde Fjord: 1 par

Sorthovedet måge er en fåtallig ynglefugl herhjemme, og Danmark ligger på nordgrænsen af artens udbredelsesområde. Herhjemme yngler den udelukkende i kolonier af hætte- eller stormmåger, hvilket yder den beskyttelse mod rovdyr. Stort set alle ynglefund er gjort i landets sydlige del, hovedsageligt det sydlige Jylland samt på Fyn og Sjælland.

I Roskilde Fjord har arten ynglet på Øksneholm med et par i 2010-2011, 2013-2014 og i 2017 samt enkelte år ved Selsø Sø. I 2026 ynglede et par i hættemågekolonien på Eskilsø. Den danske ynglebestand udgjorde i 2021 mellem 38 og 43 ynglepar (DOF 2026).



Sorthovedet måge, nederst i midten, på vandet mellem to hættemåger. Arten ynglede i 2026 i hættemågekolonien på Eskilsø. Foto: Steen Højmark-Jensen

5.2.8 Fjordterne

Ynglebestand i Roskilde Fjord: 125 ynglepar (plus fire par Selsø Sø)

Roskilde Fjord har tidligere været et af fjordternens vigtigste yngleområder i Danmark (Bregnballe et al. in prep.). Fra at have ynglet med flere hundrede par i midten af 90'erne og tidligere er fjordternen blevet en mere fåtallig ynglefugl ved Roskilde Fjord. I 2020 faldt bestanden dramatisk til blot otte par, hvilket var den hidtil laveste bestand i hele overvågningsperioden.

Fra at være tæt på at forsvinde fra fjorden som ynglefugl, steg bestanden i 2021 og 2022 til henholdsvis 35 og 32 ynglepar. Fra 2023-2025 steg bestanden yderligere fra 48 par til 98 ynglepar, hvilket gjorde 2025 til det bedste år for arten i fjorden siden 2007. I 2026 steg bestanden yderligere til 125 par. Dermed var bestanden dette år den højeste siden 2002.

Næsten alle ynglepar i 2026 blev fundet på tre øer: Eskilsø (75 par), Øksneholm (29 par) og Lilleø (19 par). Desuden sås en rugende fugl på Slinken og en varslende fugl på Langholm ved Jyllinge. Yderligere fire par ynglede ved Selsø Sø.

Eneste yngleplads i de tre kommuner og nationalparken i 2026 udenfor Roskilde Fjord og Selsø Sø var Gundsømagle Sø, hvor 1-2 par ynglede.

Fjordternen er også på landsplan i tilbagegang og står opført på Rødlisten (DCE 2025) som "NT" = "Næsten Truet".

Oversigten over bestandsudviklingen for kystfuglene på 108 øer og 24 kystlokaliteter omkring Fyn viser, som i Roskilde Fjord, en meget markant tilbagegang for fjordternen fra 1974-76 til 2021-22 (Andersen & Bisschop-Larsen 2023).



Fjordterne – havde et særdeles godt år i Roskilde Fjord med 125 ynglepar i 2026.

5.2.9 Havterne

Ynglebestand i Roskilde Fjord: 73 par

Som fjordternen har også havterne i de tidligere overvågningsår ynglet med flere hundrede par i Roskilde Fjord, men er siden gået markant tilbage, selvom bestanden de seneste ca. 10 år har udvist en vis fremgang. I 2020 ynglede blot 13 par, hvilket var det laveste antal ynglepar i fjorden i hele den periode, hvor der er foretaget tællinger.

I 2025 faldt bestanden fra 66 par til blot 31 par, hvilket dog er på niveau med de fleste af de seneste 10 optællingsår. Nedgangen dette år skyldes hovedsageligt, at en koloni på sydspidsen af Øksneholm skrumpede ind fra 36 par i 2024 til blot seks par i 2025. I 2026 steg bestanden markant til 73 par, hvilket er den største ynglebestand siden 2013, hvor 95 par ynglede. Flest fugle ynglede på Lilleø (30 par), Øksneholm (22 par) og Eskilsø (16 par). Desuden ynglede 2-3 par på henholdsvis Elleore og Skovholmene.

Der er ikke i DOFbasen (2026) indtastet oplysninger om ynglende havterner i de tre kommuner eller nationalparkens område uden for Roskilde Fjord. Havternen står opført på Rødlisten (DCE 2026) som ”VU” = ”Sårbar”.

Oversigten over bestandsudviklingen for kystfuglene på 108 øer og 24 kystlokaliteter omkring Fyn viser, som i Roskilde Fjord, en markant tilbagegang for havternen fra 1974-76 til 2021-22 (Andersen & Bisschop-Larsen 2023).



Havterne ved Jyllinge – 73 par ynglede i 2026.

5.2.10 Rovterne

Ynglebestand i Roskilde Fjord: 1 par

Under tællingen på Eskilsø den 2. juni blev observeret to rovterner, heraf også en rugende fugl i hættemågekolonien på Studeholm. Senere på sommeren blev gjort observationer, der tyder på, at endnu et par kan have ynglet i 2026, og to unger blev observeret i hættemågekolonien på Studeholm (Sam Christensen, pers. medd,). Det er dermed tredje år i træk, at arten yngler på Eskilsø.

I 2021 blev registreret muligt ynglende rovterne på den nordlige del af Øksneholm i Frederikssund Kommune, men arten blev ikke observeret ynglende i fjorden på tællingerne i 2022-2023.

Der er ikke i DOF-basen (2026) indtastet oplysninger om ynglende rovterner i de tre kommuner uden for Roskilde Fjord. Rovternen står opført på Rødlisten (DCE 2026) som ”CR” = ”Kritisk Truet”.



Rovterne – ynglefugl på Eskilsø i 2024-2026. Foto Steen Højmark-Jensen.



Rugende rovterne på Eskilsø, juni 2026

5.2.11 Andre arter af ynglefugle i fjorden 2026

Toppet lappedykker er fast ynglefugl på Skovholmene i lejre Vig, hvor de mere brakvandspåvirkede forhold og de veludviklede rørskove giver egnede yngleforhold. I 2026 ynglede seks par på Skovholmene og yderligere to par ynglede ved Selsø Sø.

Grågås er en almindelig ynglefugl med 29 par på fjordens øer og holme, 48 par ved Selsø Sø og yderligere tre par ved Bredvig Sø i 2026.



Grågås på Flængholm, juni 2026.

Knarand har i en årrække været fast ynglefugl på Eskilsø (seks par i 2026), men blev ikke fundet på andre af fjordens øer og holme i 2026. Derudover ynglede 10 par ved Selsø Sø og to par ved Bredvig Sø.

Skeand yngler de fleste år med mellem ca.10 og 20 ynglepar i Roskilde Fjord. I 2026 ynglede 22 par i selve fjorden. Dertil kommer seks par ved Selsø Sø.

Spidsand har enkelte år ynglet på Eskilsø, således også i 2026, hvor en hun med tydelig afledningsadfærd blev set nord for Klydesøen den 2. juni. Arten er blevet en temmelig sjælden ynglefugl herhjemme, og Dansk Ornitologisk Forening anslår, at kun omkring 25 par spidsænder yngler i Danmark (DOFbasen 2026a).

Troldand har i de senere år opbygget en lille ynglebestand på holmene i den sydligste del af fjorden (Skovholmene, Hyldeholm Lejre og Ringøen). Her ynglede 11 par i 2026. Dertil kommer 12 par ved Selsø Sø.

Havørn er, efter 100 års fravær, tilbage som ynglefugl i Roskilde Fjord. De seneste år har mellem to og fire par ynglet ved fjorden. I 2026 var der fire par i Roskilde Fjord området: Bognæs (ingen unger), Borrevejle (ingen unger), Nordskoven (to unger), Østskov (ingen unger).

Derudover ynglede havørnen ved Tempelkrogen ved Isefjord (én unge) og Orebjerg i det nordlige Hornsherred (to unger), (Ole Friis Larsen, Projekt Ørn, pers. medd.).



Spidsand – ynglefugl på Eskilsø i 2026. Foto Steen Højmark-Jensen.



Skeænder – ynglede l i Roskilde Fjord i 2026. Foto Steen Højmark-Jensen.



Havørnepar ved Roskilde Fjord. Foto Steen Højmark-Jensen.

Øerne og holmene i Roskilde Fjord rummer desuden stabile bestande af forskellige arter af vadefugle, hvoraf flere er i tilbagegang herhjemme. Eskilsø er fjordens klart vigtigste ynglelokalitet.

Vadefugle som strandskade (94 par), vibe (47 par), stor præstekrave (11 par) og rødben (38 par) ynglede i 2026 på fjordens øer og holme. Desuden ynglede lille præstekrave, der er rødlistet som "Næsten Truet", ved Selsø Sø og Bredvig Sø, hvert sted med ét par.




Stor præstekrave –11 par ynglede ved Roskilde Fjord i 2026. Foto Steen Højmark-Jensen.




Lille præstekrave – ynglefugl ved Selsø Sø og Bredvig Sø i 2026. Foto Steen Højmark-Jensen.

Målrettet naturpleje, herunder vedvarende regulering af den lokale rævebestand på især Eskilsø, har været til stor gavn for disse arter af vadefugle, og bestandene på Eskilsø har de seneste ca. 10 år været i markant fremgang, se Figur 5-4 og Figur 5-5 for vibe og rødben og Figur 5-2 for klyde.



Figur 5-4. bestandsudvikling for vibe (antal ynglepar) på Eskilsø 2015-2026.



Figur 5-5. bestandsudvikling for rødben (antal ynglepar) på Eskilsø 2015-2026.



Strandskadeunge – arten ynglede med 94 par på fjordens øer og holme i 2026.



Rødben unge – arten ynglede med 38 par på fjordens øer og holme i 2026.



Vibeunge på Eskilsø – arten ynglede med 47 par på fjordens øer og holme i 2026.

Endeligt kan nævnes, at et par skovhornugler for første gang ynglede på Eskilsø i 2026, hvor parret fik fire unger. I DOFbasen (2026) nævnes derudover kun fire ynglefund fra Roskilde Fjordområdet fra de seneste 10 år.





Skovhornugleunger på Eskilsø fra sommeren 2026. Fotos: Sam Christensen.

5.3 Bredvig Sø og Klydesøen

Som i de foregående år, blev der også i 2026 optalt fugle ved Bredvig Sø umiddelbart syd for Selsø Sø i Frederikssund Kommune, dvs. i den nordlige del af Nationalpark Skjoldungernes Land. Bredvig Sø blev etableret af Frederikssund Kommune i vinteren 2017/18 med henblik på at reducere nitratudvaskningen til Roskilde Fjord. Området har tidligere været afvandet, men udpumpning af vand er nu stoppet, og der er opstået en mere eller mindre permanent ferskvandssø bag diget.

En række forskellige arter af vandfugle har indfundet sig i det nye vådområde (Tabel 5-3), herunder adskillige arter, der er "Sårbare", "Næsten Truede" eller "Truede" jf. Rødlisten (DCE 2026).

I 2021 opstod en koloni med 250 par hættemåger i det nye vådområde. I 2022 ynglede hele 450 par. Sandsynligvis drejer det sig om "tilflyttere" fra Selsø Sø, hvor antallet gik tilbage, og hvor arten opgav yngel på øen ved Ventevej i områdets nordlige ende. I 2023 indfandt 380 par sig, men disse ynglede ikke med succes pga. prædation fra ræv. I 2024 ynglede blot 10 par, og hverken i 2025 eller 2026 ynglede arten ved søen. Også klyde har regelmæssigt ynglet eller forsøgt at yngle ved søen (Tabel 5-3), og i 2026 ynglede hele 47 par, hvilket er det højeste antal hidtil.

Fra 2026 skal derudover først og fremmest fremhæves blåhals, der fortsat er en fåtallig ynglefugl på Sjælland samt et par rødrygget tornskade, der blev set i området med to unger. Arten er ny for området og står på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet Roskilde Fjord. Den er dog en fåtallig ynglefugl ved fjorden, og fundet ved Bredvig Sø er det eneste fund i fuglebeskyttelsesområdet af fugle med yngleadfærd fra 2026 i DOFbasen (2026).

Hvordan fuglelivet ved Bredvig Sø vil udvikle sig fremover, afhænger i høj grad af driften på randarealerne. Disse bør ryddes og afgræsses eller slås, hvis områdets værdi for vandfugle skal bevares. Desuden skal sikres en passende høj vandstand.



Bredvig Sø, april 2026.



Blåhals – har ynglet med et par ved Bredvig Sø i 2024-2026. Foto Steen Højmark-Jensen.



Rødrygget tornskade – ynglede med et par ved Bredvig Sø i 2026. Foto Steen Højmark-Jensen.

Tabel 5-3: Vurderet bestandstørrelse af ynglefugle ved Bredvig Sø 2019-2026. Desuden er anført de enkelte arters status på Rødlisten (DCE 2026), idet LC = "Livskraftig", VU = "Sårbar", NT = "Næsten Truet", "EN" = "Truet", "CR" = Kritisk Truet. * = Ringe/manglende ynglesucces.

Art	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lille lappedykker (LC)	0	0	0	1	1	2	2	1
Knopsvane (LC)	0	1	1	1	2*	2*	2	1
Grågås (LC)	0	0	0	6	8	9	5	3
Gravand (VU)	0	0	2	1	0	0	1	1
Knarand (LC)	0-1	0-1	0	0	1	2	2	2
Gråand (LC)	0-1	0-1	1	2	0	0	2	0
Skeand (VU)	0-1	0-1	1	0	1	0	0	0
Agerhøne (VU)	0	0-1	0	0	0	0	0	0
Rørhøne (VU)	0	0-1	0	0	0	0	0	0
Blishøne (VU)	2	2	1	2	3	2	2	2
Vandrikse (LC)	0	0	0	1	0	0	1	0
Strandskade (LC)	1	0-1	0	1	1	1	2	2
Klyde (VU)	0	5	4-5	0	7*	0	25*	47
Stor præstekrave (VU)	0	0	1-2	0	0	1	1	0
Lille præstekrave (NT)	0-1	0-1	1-2	1	1	0	1	1
Vibe (VU)	3	4	5-6	5	6	4	3	3
Rødben (NT)	2-3	2	2	0	2	3	2	2
Hættemåge (EN)	0	0	250	450	380*	10	0	0
Rødrygget tornskade (LC)	0	0	0	0	0	0	0	1
Gøg (NT)	0	0	0	0	1	2	2	1
Sanglærke (NT)	1	7	6	11	12	12	9	14
Engpiber (LC)	0	1	1-2	0	1	1	1	2
Hvid vipstjert (LC)	0	0	1-2	1	2	2	1	0
Gul vipstjert (LC)	5	0-3	3-4	2	3	2	2	1
Nattergal (VU)	0	0	1	1	1	0	2	1
Blåhals (LC)	0	0	0	0	0	1	1	1
Bynkefugl (LC)	0	0-2	1	0	0	0	0	0
Gærdesanger (LC)	0	0	0	0	1	0	0	2
Tornsanger (LC)	0	0	2	2	2	2	4	3
Sivsanger (LC)	0	0	0	1	1	1	0	1
Kærsanger (LC)	0	1	1	2	2	1	2	1
Rørsanger (NT)	0	1	0	3	2	2	2	2
Gulbug (VU)	0	0	0	0	0	1	0	0
Tornirisk (LC)	0	0	0	2	3	1	2	0
Rørspurv (NT)	1-2	4	2-3	4	4	2	4	2
Gulspurv (VU)	0	0	2	3	3	2	5	3

Desuden rastede og fouragerede en række arter af vandfugle ved Bredvig Sø i 2026. Fra listen over rastefugle kan bl.a. fremhæves helt op til 11 sølvhejrer i 2024, 4.000 bramgæs i 2025, samt at hele 19 arter af vadefugle nu er observeret i området (Tabel 5-4).

Tabel 5-4: Rastende fugle ved Bredvig Sø 2019-2026. Tallene er maks-tal, dvs. det højeste antal fugle set på lokaliteten det pågældende år. Årenes tællinger er suppleret med DOF-basen (2026).

Art/år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sølvhejre					2	11	4	1
Bramgås	4200		800	1500	2500	540	4000	2500
Strandskade	3	4	1	11	4	3	6	5
Klyde	3	17	2	5	15	16	76	60
Lille præstekrave	1	4	4	6	2	2	4	9
Stor præstekrave		2	4	3	1		6	3
Vibe	6	14	14	35	63	122	80	9
Dværgryle					1			
Temmincksryle		7		7	11		2	6
Krumnæbbet ryle				2				
Almindelig ryle				115	31	8	7	4
Brushane		8		14	12	6	19	5
Dobbeltbekkasin				67	2	15	2	12
Lille kobbersneppe				2			2	
Storspove					6		1	
Sortklire				3	4	4	2	2
Rødben		9	6	5	14	7	4	6
Hvidklire	1	3		19	22	5	20	8
Svaleklire				7	6	6	3	12
Tinksmed	1	35		33	29	5	29	13
Mudderklire		2	1	1	1		1	1

Klydesøen (= Lille Rørsø) ligger centralt på Eskilsø, umiddelbart nord for Rørmosen. I de perioder, hvor der er vand i søen, udgør det vanddækkede areal ca. 2,5 hektar. Indtil 2018 tørrede Klydesøen dog ofte ud i løbet af sommeren. Frederikssund Kommune, Nationalpark Skjoldungernes Land og Struckmanns Naturfredningsfond samarbejdede derfor i vinteren 2018/19 om at få hævet vandstanden og sikre et mere stabilt vanddække i søen. Projektet omfattede hovedsageligt tilkastning af dræn.

Projektet med at hæve vandstanden og sikre et mere permanent vanddække i Klydesøen på Eskilsø 2018/2019 har virket efter hensigten. Der har været vand i Klydesøen ved alle besøg i 2019-2025, og Klydesøen lever nu for alvor op til sit navn, da klyder med yngleaktivitet har været observeret ved søen årligt i perioden 2021-2026.

I 2026 ynglede klyde, vibe, rødben og strandskade på bredden i umiddelbar tilknytning til den nye sø, og en række arter af andefugle og måger sås raste på vandfladen.

I maj måned 2019 opholdte den meget sjældne nordamerikanske trækgæst blåvinget and sig ca. en uge i Klydesøen og blev observeret under tællingerne dette år.


5.4 Fuglebeskyttelsesområdet

Fuglebeskyttelsesområdet Roskilde Fjord er udpeget for de ynglende Bilag 1-arter rørdrum, havørn, rørhøg, klyde, sorthovedet måge, dværgterne, fjordterne, havterne og rødrygget tornskade.

Havørnen har 3-4 faste ynglepladser omkring fjorden, sorthovedet måge har hidtil ynglet meget sporadisk på Øksneholm og Selsø Sø, hvor den senest blev fundet i 2021. Desuden blev arten fundet på Eskilsø ved den seneste tælling i 2026.

Dværgterne har været forsvundet som ynglefugl i en lang årrække. Rørhøg yngler årligt ved Selsø Sø, Svogerslev Sø, Kattingesøerne og Gundsømagle Sø med 1-2 par, og rørdrum yngler årligt ved Gundsømagle Sø og næsten årligt ved Svogerslev Sø og Kattingesøerne. Rødrygget tornskade ynglede i 2026 ved Bredvig Sø, måske som det eneste sted i hele Roskilde Fjord-området (DOFbasen 2026).

Den kommunale fordeling i 2026 af de tre aktuelt ynglende udpegningsarter på holmene i Roskilde Fjord samt Selsø Sø og Bredvig Sø fremgår af Figur 5-6.



Figur 5-6: Kommunal fordeling af ynglende udpegningsarter i 2026.

5.5 Ikke-ynglende arter

Desuden blev i 2026 i DOF-basen noteret en række arter af rastende vandfugle, rovfugle og spurvefugle ved Roskilde Fjord (DOF-basen 2026). Et udvalg af disse er sammenfattet i Tabel 5-5.

Fra denne liste kan bl.a. fremhæves rødhovedet and ved Frederiksværk og Sølager den 27. januar, sortterne ved Græse Strandenge den 26. juli og kaspisk måge samme sted den 26. juli samt drosselrørsanger ved Store Kattinge Sø den 27. maj, sortspætte på Bognæs den 21. marts og 19 havørne på Eskilsø den 9. februar.

Tabel 5-5: Udvalgte rastende fuglearter set i 2026 per 8. september i og omkring Roskilde Fjord. Tallene er maks-tal, dvs. det højeste antal fugle set. Årets tællinger er suppleret med DOF-basen (2026).

Artsnavn	Antal	Dato	Lokalitet	Artsnavn	Antal	Dato	Lokalitet
Lille lappedykker	57	25-01	Eskilsø	Vibe	420	23-08	Selsø Sø
Toppet lappedykker	82	15-08	Bredvig	Islandsk ryle	50	04-09	Græse strandenge
Gråstrubet lappedykker	20	19-04	Bolund	Temmincksryle	7	10-05	Selsø Sø
Sorthalset lappedykker	4	06-07	Selsø Sø	Krumnæbbet	2	04-09	Bløden
Sølvhejre	7	02-08	Selsø Sø	Brushane	25	06-09	Bredvig Sø
Pibesvane	4	20-03	Græse strandenge	Enkeltbekkasin	1	11-04	Bolund
Sangsvane	275	11-01	Eskilsø	Stor kobber-	1	13-06	Selsø Sø
Blisgås	350	22-03	Selsø Sø	Lille kobber-	14	06-04	Græse strandenge
Grågås	3250	27-05	Selsø Sø	Småspove	3	03-07	Græse strandenge
Bramgås	4500	22-03	Eskilsø	Storspove	165	29-01	Sølager Strandeng
Pibeand	2800	05-03	Eskilsø	Sortklire	21	13-06	Selsø Sø
Krikand	343	23-08	Selsø Sø	Rødben	43	23-08	Græse strandenge
Spidsand	63	06-03	Græse strandenge	Hvidklire	48	21-04	Græse strandenge
Skeand	368	23-08	Selsø Sø	Svaleklire	31	20-06	Selsø Sø
Rødhovedet and	1	27-01	Frederiksværk/Sølager	Tinksmed	46	02-08	Selsø Sø
Taffeland	160	09-01	Kattinge Vig	Mudderklire	13	17-08	Selsø Sø
Bjergand	24	20-03	Selsø Sø	Dværgmåge	2	06-06	Selsø Sø
Sortand	35	24-01	Sølager	Kaspisk måge	1	26-07	Græse strandenge
Fløjlsand	7	24-01	Sølager	Rovterne	4	07-08	Bløden
Hvinand	370	11-01	Eskilsø	Splitterne	35	07-08	Græse strandenge
Lille skallesluger	38	15-03	Bredvig	Sortterne	3	20-05	Græse strandenge
Toppet skallesluger	284	03-03	Græse strandenge	Alk	1	29-01	Sølager Strandeng
Stor skallesluger	272	07-03	Bolund	Huldue	4	08-07	Bognæs Storskov
Havørn	19	09-02	Eskilsø	Isfugl	2	11-01	Kattinge Vig
Blå kærhøg	1	12-04	Eskilsø	Sortspætte	1	21-03	Bognæs Halvøen
Duehøg	1	21-03	Bognæs Halvøen	Gul vipstjert	35	23-08	Selsø Sø
Fiskeørn	1	21-08	Græse strandenge	Silkehale	40	19-01	Græse strandenge
Dværgfalk	1	23-08	Selsø Sø	Vandstær	1	21-02	Kornerup Sø
Vandrefalk	2	14-01	Frederiksværk	Sortstrubet byn-	1	22-03	Nordskovsengene
Strandskade	57	07-03	Græse strandenge	Græshoppesan-	1	09-07	Svogerslev Sø
Lille præstekrave	9	30-06	Bredvig Sø	Drosselrørsan-	1	27-05	Store Kattinge Sø
Stor præstekrave	12	23-08	Selsø Sø	Rødrygget torn-	2	30-05	Nordskovsengene
Hjejle	600	27-08-	Stenø Frederikssund	Stor tornskade	1	22-03	Nordskovsengene
Strandhjejle	10	06-08	Eskilsø	Bjergirisk	30	19-01	Frederiksværk



Toppede skalleslugere ved Frederikssund. Foto Steen Højmark-Jensen.



Pibeænder ved Frederikssund. Foto Steen Højmark-Jensen.



Hvinænder ved Frederikssund. Foto Steen Højmark-Jensen.


6 LANGTIDSUDVIKLING

Når der ses på den langsigtede udvikling i hele overvågningsperioden, nåede ynglefuglebestandene i fjorden efter ca. ti år med fremgang for mange arter, især måger og terner, et foreløbigt maksimum på over 20.000 par i 1986. Derefter fulgte en tilbagegang for en række arter, hvilket bl.a. blev tilskrevet forekomsten af rotter på en del af holmene. I første halvdel af 1990'erne syntes tilbagegangen standset for de fleste arter, bl.a. på grund af flere års intensiv rottebekæmpelse udført i forbindelse med ynglefugletællingerne (Bregnballe et al. 2022). Denne stabilisering blev dog vendt til en ny tilbagegang (Figur 6-1).


En stor del af den samlede nedgang i antallet af ynglende vandfugle gennem årene skyldes meget markante langsigtede tilbagegange for stormmåge og hættemåge. Vigtigste undtagelse fra det generelle indtryk af bestandstilbagegange er ederfugl og sølvmåge, hvoraf især den førstnævnte har udvist markant langsigtet fremgang de senere år. Bestandsudviklingen 1978-2026 for udvalgte arter er vist Figur 6-2. Det bemærkes her, at det samlede antal ynglefugle for første gang i en lang årrække gik frem 2025-2026. Med 3.609 ynglepar i 2026 i hele fjorden er den samlede ynglebestand af vandfugle således større end året før (3.044). Fremgangen skyldes især, at flere ederfugle ynglede i 2026.


De strandenge og søer, der ikke indgår i det faste overvågningsprogram, rummede ved den seneste dækning i 2007-2008 ingen ynglende "udpegningsarter" men kan fortsat rumme bestande af engfugle som vibe, rødben, engpiber og gul vipstjert, der ellers er i tilbagegang herhjemme.


Disse og andre karakterarter for strandeng er da også fundet ved tidligere fugletællinger ved Krabbesholm (Orbicon 2014-2015), Bolund (Orbicon 2015), strandengene ved Græse Bakkeby (Orbicon 2016) og på strandengene ved Parcelgården i Roskilde Kommune (WSP 2021).





Figur 6-1: Bestandsudvikling 1978-2026 (ynglepar) for vandfugle (alle arter) på holme og øer i Roskilde Fjord.





















Figur 6-2: Bestandsudvikling i Roskilde Fjord minus Selsø Sø området 1978-2026 for udvalgte arter.

Det fremgår af Figur 6-2, at en meget stor del af tilbagegangen i det samlede antal ynglefugle over hele perioden 1978-2026 skyldes, at hættemågebestanden er reduceret fra mere end 15.000 ynglepar i midten af 1980'erne til nogle få hundrede ynglepar i 2020'erne. Også nedgang i bestandene af stormmåge, knopsvane, klyde samt hav- og fjordterne bidrager til den samlede nedgang i perioden.

Det fremgår dog også, at såfremt der "zoomes ind" på de seneste 10 år, er billedet knap så entydigt, idet sølvmåge og stormmåge er de eneste af de viste arter, der går tilbage (Figur 6-3).



Figur 6-3: Bestandsudvikling i Roskilde Fjord minus Selsø Sø området 2015-2026 for udvalgte arter.

7 TILTAG TIL GAVN FOR FUGLENE

De vigtigste forhold vedrørende trusler, plejebehov for lokaliteterne, der indgår i overvågningen, er sammenfattet i Tabel 5-2. For større lokaliteter som Eskilsø eller Selsø Sø er der typisk tale om forslag vedrørende græsningspraksis, regulering af prædatorer og/eller rydning af vedplanter og høje urter.

Græsningen på større lokaliteter som Eskilsø bør nøje følges og om nødvendigt justeres for at sikre, at der ikke sker trampeskader, dvs. situationer, hvor græssende dyr ødelægger jordrugende fugles reder og æg, som det f.eks. blev set i 2019 (men ikke siden). Problemet kan bedst imødegås ved at hegne de mest følsomme områder fra på de mest følsomme tidspunkter i fuglenes yngletid eller ved helårsgræsning med færre dyr. Ejeren af Eskilsø, Struckmanns Naturfredningsfond, har derfor reduceret antallet af græssende kreaturer på Eskilsø til ca. 50 dyr.

Der bekæmpes vedvarende rotter, mink og ræv på fjordens vigtigste fuglelokaliteter. Særligt på Lilleø og Eskilsø har indsatsen været massiv, hvilket rimeligvis er årsagen til de markante fremgange, der de senere år er set for måger, terner og vadefugle på øerne.

En videnskabelig artikel (Bregnballe et al. 2022) konkluderer, at tilstedeværelsen af rotter i Roskilde Fjord har en signifikant negativ effekt på antallet af ynglepar af klyde, hættemåge og fjordterne.

Der blev i 2026 fundet spor efter rotter på Eskilsø, Yderste Holme, og Tobaksholm. Desuden blev der i 2026 fundet mink på Eskilsø (fem dyr reguleret), Hyldeholm (fire dyr reguleret) og Peberholm (et dyr reguleret). Der formodes derudover at være mink i alle havnene rundt om fjorden. Forekomst af ræv kunne konstateres på Langholm i Lejre Vig, hvor en ræv blev set under en rottekontrol i marts og på Eskilsø, hvor der har været otte ræve i 2026. Alle ræve på øen blev reguleret inden 1. april, dvs. inden fuglenes yngletid.

Desuden er den invasive art rynket rose fundet på enkelte holme.

På ingen lokaliteter kunne konstateres direkte prædation, der kunne relateres til rotter. Det er dog vigtigt årligt at undersøge holmene senest i januar-februar for forekomst af rotter og om nødvendigt foretage en bekæmpelse, så holmene er rottefri, når fuglene ankommer til ynglepladserne i marts-april.

Rottebekæmpelsen foregår ved en kombination af forskellige tiltag: droner, besigtigelser, vildtkameraer, hunde, skydning og forskellige former for fælder. På Eskilsø har det tidligere været nødvendigt, under overholdelse af de gældende regler, at inddrage rottegift i bekæmpelsen af rotter i forbindelse med gården og huset på øen. Der er dog ikke anvendt rottegift på øen i 2026.

Indsatsen foretages i samarbejde med de tre kommuners rottebekæmpelse, lokale frivillige, jagtforeningen Jyllinge Holme, Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes Land. Kommunerne foretager hvert forår en besigtigelse med deres skadedyrsspecialister og lægger en strategi for bekæmpelsen. Samtidig understøtter Naturstyrelsen løbende overvågningen med drone, og Nationalpark Skjoldungernes Land opsætter vildtkameraer for at få bekræftet, om der er rotter, mink eller også ræv på

lokaliteten. Frivillige fra bl.a. Jagtforeningen Jyllinge Holme har, i samarbejde med kommunerne bl.a. bekæmpet rotter på Lilleø og Eskilsø.

Rævebekæmpelsen på Eskilsø virker efter hensigten, og der bør fortsat være fokus på eliminering af ræv på lokaliteten. Øen har fortsat potentiale som ynglelokalitet for vadefugle, måger og terner, som næppe kan realiseres med tilstedeværelsen af ræve.

At ræve nogle år har stor effekt på bestandene af jordrugende fugle blev i 2026 illustreret ved, at en eller flere ræve i en periode havde gjort ophold på Langholm ved Lejre, der (bortset fra et par grav-ænder, der havde slået sig ned i rævegraven), næsten ikke rummede ynglefugle dette år (se foto).



Rævegrav på Langholm ved Lejre i 2026.

Der er tidligere konstateret mink i havnene i Jyllinge, Gershøj, Veddelev og Skovbroen, og forekomster i andre havne er sandsynlige. Mink herfra og fra andre områder kan få adgang til vigtige fuglelokaliteter og bør bekæmpes. Nationalpark Skjoldungernes Land, Naturstyrelsen og HHE v/Hans-Henrik Erhardi påbegyndte derfor i 2024 et toårigt projekt om bekæmpelse af mink i nationalparken.

Reguleringen af sølvmåger på Jyllinge Holme har i en årrække reduceret artens ynglesucces lokalt på de øer, hvor den foregår og kan også være en medvirkende årsag til den meget markante nedgang i antallet af fugle og den lave ynglesucces, der er set de seneste tre år.

For hovedparten af holmene nævnes desuden forstyrrelser som en sandsynlig faktor, der kan påvirke ynglefuglebestandene. Derfor fik Naturstyrelsen, de tre fjordkommuner og Nationalpark Skjoldungernes Land i vinteren 2018/19 opsat skilte med information om færdselsregler og adgangsforbud på alle de vigtigste ynglelokaliteter rundt om i fjorden. Skiltene tilses årligt, vedligeholdes og udskiftes, hvis der er behov for dette.

Der arbejdes desuden med anden målrettet information og tiltag, der kan forebygge, at sejlende eller windsurfere går i land på øerne i yngletiden. Naturstyrelsen, de tre fjordkommuner og Nationalpark

Skjoldungernes Land har f.eks. udgivet en folder, som formidler fjordens færdselsregler og anden hensynsfuld færdsel på fjorden.

Som tidligere nævnt har de tre kommuner, Nationalpark Skjoldungernes Land, Aarhus Universitet og WSP desuden samarbejdet om en artikel, der sammenfatter bestandsudviklingen for fjordens ynglende vandfugle og udviklingen i yngleforholdene på holmene og i fjorden (Bregnballe et al. in prep.).



På praktisk taget alle øer i Roskilde Fjord skiltes med færdselsreglerne i vildtreservatet.

I 2019 støttede de tre kommuner og Nationalpark Skjoldungernes Land et forskningsprojekt, der havde til formål at belyse, hvordan kajaksejlads påvirker rastende og fældende knopsvaner, og hvordan sejladsen kan tilrettelægges uden at forstyrre fuglene (Holm et al. 2019), se foto nedenfor.

Der er dog ikke under de seneste fem års tællinger observeret overtrædelse af reglerne for færdsel i vildtreservatet eller set episoder, hvor rekreative aktiviteter forstyrrer områdets fugleliv.

I vinteren 2022/23 etablerede Nationalpark Skjoldungernes Land i samarbejde med Miljøstyrelsen tre nye stenrev i Roskilde Fjord. De nye stenrev ligger ved Veddelev, Nørrerev og den lille ø, Ægholm.

Nationalpark Skjoldungernes Land undersøger desuden, evt. med samarbejdspartnere, mulighederne for at gennemføre følgende tiltag i den kommende planperiode for nationalparken:

- Udplantning af ålegræs med frivillige.
- Etablering af muslingerev.
- Etablering af 'smolt-rev'.
- Forsøg med klimasikring af holme.
- Forsøg med etablering af yngleplatforme.
- Udarbejdelse af katalog over mulige virkemidler.

I 2024-2025 har Struckmanns Naturfredningsfond i samarbejde Nationalpark Skjoldungernes Land undersøgt mulighederne for og konsekvenserne af at gennemføre helårsgræsning, fremme udviklingen af overdrev og skabe en naturlig hydrologi i Rørmosen på Eskilsø.

Sidstnævnte projekt i Rørmosen forventes realiseret i efteråret 2026, idet en del af det dige, der i dag adskiller Rørmosen fra Eskilsøs strandenge mod syd fjernes. Formålet er at forbedre vandudskiftning og vandkvalitet i Rørmosen og at øge det samlede areal med strandeng på øen.



Projekt om kajakkers forstyrrelser af knopsvaner i Roskilde Fjord (Holm et al. 2019). Foto Thomas Eske Holm.



Diget, der i dag adskiller strandengene mod syd fra området ved Rørmosen, juni 2026.

Endeligt kan nævnes, at Energinet planlægger den fremtidige netstruktur i og omkring Roskilde Fjord. Baggrunden er, at luftledningerne i området trænger til at blive udskiftet, og at nogle af luftledningerne skal erstattes med elkabler i jorden (NYE ELKABLER I OG OMKRING ROSKILDE FJORD).

Arbejdet med at fjerne luftledninger og master, der er planlagt til 2030-2031, omfatter også de luftledninger mellem Skuldelev Strand og Lille Rørbæk tværs over Roskilde Fjord. Dette kan gavne fuglelivet, da ledningerne må formodes at udgøre en betydelig kollisionsrisiko for Roskilde Fjords yngle- og trækfugle.



Udsigt over diget, strandengene og området tilstødende Rørmosen på den sydlige del af Eskilsø. Juni 2026.



Højspændingsledningerne, der skal fjernes som et af Energinets "forskønnelsesprojekter".

8 REFERENCER

Andersen, N. & Bisschop-Larsen 2023. Kystfuglene omkring Fyn. Ynglefugle på 108 øer og kystlokaliteter. – Dansk ornitologisk lokalafdeling for Fyn.

Bregnballe, T., Thorup, O., Jacobsen, L.B. Kjeldsen, J.P. & Hansen, M. 2015a: Udviklingen i ynglebestanden af klyder i Danmark 1970-2014. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109-3: 121-133.

Bregnballe, T., Jørgensen, H.E., Christensen, C. & Drachmann, J. 2015b: Udviklingen i ynglebestanden af hættemåger i Danmark 1970-2010. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109-4: 179-192.

Bregnballe, T. Sunde, P., Clausen, K.K. 2022. Occurrence of rats and their impacts on colonial waterbirds in a Danish fjord. - Ornis Fennica 99: 37–51.

Christensen, J. S, Hansen, Hesselballe, T., Rasmussen, P., A., F, Nyegaard, T., Eskildsen, D., P., Clausen, P., Nielsen, R., D., Bregnballe, T. 2022. Systematisk oversigt over Danmarks fugle 1800-2019. – Dansk Ornitologisk Forening.

Bregnballe, T., Jacobsen, E.M. Andersen-Harild, P. & Hansen, E. in prep. Udviklingen i ynglebestandene af vandfugle i og ved Roskilde Fjord 1978-2019.

DCE 2026: Udtræk fra Rødliste 2030 fra DCE's hjemmeside per 14-08-2026: AU Ecoscience - Den Danske Rødliste.

DOF 2026: Danmarks Fugle - Sorthovedet Måge.

DOF 2026a: Danmarks Fugle - Spidsand

DOF-basen 2026. Dataudtræk fra www.dofbasen.dk per 8. september 2026.

Holm, T.E., Clausen, K.K., Pedersen, C.L., Jacobsen, E.M. & Bregnballe, T. 2019. Undersøgelse af kajakkers forstyrrende effekter på fældende knopsvaner i Roskilde Fjord. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 350.

Jacobsen, E.M. 2017: Ynglende fugle i Roskilde Fjord 1978-2017. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 111 (2017): 49-58.

Jægerforbundet 2022. (Husk fredning af edderfugl i visse områder - Danmarks Jægerforbund (jaegerforbundet.dk). – Nyhedsbrev om fredning af ederfugl i ny bekendtgørelse.

Miljøstyrelsen 2023. Natura 2000-plan 2022-2027. Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Natura 2000-område nr. 136. Habitatområde H120 og H199. Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107.

Orbicon A/S 2014-2015: Ynglende fugle ved Krabbesholm. – rapport til Lejre og Frederikssund Kommuner.

Orbicon A/S 2015: Ynglende fugle ved Bolund. – Rapport til Roskilde Kommune.

Orbicon A/S 2016: Ynglende fugle på strandengene ved Græse Bakkeby. – Rapport til Frederikssund Kommune.

Orbicon A/S 2007-2017: Overvågning af ynglende fugle i Roskilde Fjord, med registrering af naturforhold. – Tværkommunal naturovervågning for Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommuner.

WSP 2025: Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2025. Naturovervågning. - Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommuner.

Vikstrøm, T., T. Nyegaard, M. Fenger, N. Brandtberg & H. Thomsen 2015: Status og udviklingstendenser for Danmarks internationalt vigtige fugleområder (IBA' er). – Dansk Ornitologisk Forening.

WSP 2021. Ynglende og rastende fugle på strandengene ved Parcelgården. – rapport til Roskilde Kommune.

Bilag 1: *Bestandsudvikling (ynglepar) 1978-2026 på øer og holme dækket hele perioden, dvs. eksklusive Selsø Sø samt strandenge og andre lokaliteter kun dækket enkelte år i perioden. Udpegnings-arter er vist med* ***fed*** *skrift.*

Bilag 1 – Roskilde Fjord	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Toppet lappedykker	0	0	0	1	4	13	7	2	4	4	2	9	8	4	8	9	10	10	4	14
Gråstrubet lappedykker	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	2	12	2	5
Lille lappedykker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Skarv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Knopsvane	265	178	309	372	292	431	631	479	586	416	643	614	501	660	856	893	524	557	138	398
Grågås	2	4	11	2	3	7	9	11	13	19	20	12	11	20	21	18	27	28	47	23
Gråand	10	14	14	10	20	26	40	42	28	38	49	50	54	54	58	39	51	77	67	56
Knarand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	9	1	1
Spidsand	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	1	3	0	2	7	5	1
Pibeand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	4	4
Krikand	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	3	4	1	0	0	0	0	2
Atlingand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1
Skeand	1	1	0	0	0	0	0	1	4	8	11	31	8	24	7	5	17	16	14	9
Gravand	11	11	14	8	6	14	9	4	7	5	6	5	7	9	5	4	2	4	4	18
Troldand	0	1	0	3	1	18	10	12	13	10	12	18	16	13	20	7	17	24	33	31
Taffeland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Ederfugl	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	5	15	2	15	27	6	28	28	27	68
Toppet skallesluger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rørhøg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
Rørhøne	0	0	1	1	0	1	5	2	1	4	1	5	4	3	3	0	0	6	3	2
Blishøne	1	0	3	2	8	26	40	14	19	22	28	43	35	46	34	42	28	41	40	30
Strandskade	89	71	102	97	120	116	147	167	130	108	125	147	152	136	129	146	141	191	142	148
Vibe	24	15	38	20	47	34	118	62	53	48	86	59	49	55	32	38	28	44	26	10
Stor præstekrave	8	18	19	22	24	17	16	17	15	9	8	17	16	18	14	19	19	17	16	14
Dobbeltbekkasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødben	22	27	29	32	36	29	70	70	63	51	73	68	40	32	32	11	28	32	23	20

Bilag 1 – Roskilde Fjord	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Alm. Ryle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
Klyde	**41**	**80**	**82**	**80**	**122**	**92**	**135**	**126**	**96**	**102**	**130**	**102**	**104**	**137**	**104**	**87**	**116**	**104**	**93**	**101**
Sorthovedet måge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Svartbag	0	1	1	3	3	6	7	4	5	7	7	6	10	15	12	10	14	22	23	28
Sildemåge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sølvmåge	510	597	716	888	894	751	760	909	791	847	925	835	786	874	952	1173	1184	1227	1175	1428
Stormmåge	865	1026	1095	1609	1387	1317	1491	1787	1770	1600	1811	1630	1359	1172	1759	1731	2164	2023	2277	2384
Hættemåge	6491	6696	6910	8303	10517	14767	13982	14957	16544	15203	13866	7767	6906	5991	5885	6589	7762	6945	7042	6857
Rovterne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splitterne	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Fjordterne	**160**	**235**	**224**	**318**	**371**	**331**	**324**	**401**	**423**	**436**	**496**	**433**	**354**	**382**	**344**	**378**	**363**	**324**	**213**	**250**
Havterne	**113**	**145**	**170**	**157**	**180**	**177**	**215**	**193**	**293**	**232**	**208**	**238**	**213**	**178**	**226**	**218**	**301**	**306**	**259**	**321**
Dværgterne	**25**	**6**	**4**	**15**	**9**	**15**	**17**	**20**	**20**	**28**	**25**	**24**	**20**	**24**	**23**	**23**	**11**	**15**	**13**	**10**
Sum	8641	9129	9743	11944	14045	18189	18034	19283	20883	19206	18548	12141	10665	9871	10558	11448	12840	12072	11692	12239

Bilag 1 – Roskilde Fjord	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Toppet lappedykker	9	11	6	10	12	25	23	25	31	12	17	17	17	15	12	6	9	10	9	9	8
Gråstrubet lappedykker	13	10	7	5	9	0	0	0	0	12	15	4	4	6	3	3	7	6	3	6	1
Lille lappedykker	4	5	3	3	2	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Skarv	0	0	0	0	0	1	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Knopsvane	552	503	478	454	391	534	420	475	364	210	269	385	254	227	259	333	190	146	126	115	163
Grågås	51	44	45	71	51	58	37	63	76	27	34	44	72	57	44	52	32	44	17	44	45
Gråand	60	64	101	88	61	0	0	0	0	63	52	40	41	56	62	59	44	46	26	33	55
Knarand	1	1	4	2	2	0	0	0	0	12	15	13	14	15	10	8	17	7	7	14	10
Spidsand	2	1	3	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pibeand	6	4	4	4	2	0	0	0	0	2	3	2	5	6	0	2	3	0	0	0	0
Krikand	2	0	5	3	3	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0	0	1	0	2	0	0
Atlingand	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Skeand	9	7	12	9	7	0	0	0	0	1	5	3	12	26	12	12	21	10	0	15	8
Gravand	6	7	2	3	1	0	0	0	0	64	102	87	82	80	109	95	79	83	58	67	120
Troldand	31	28	21	34	40	0	0	0	0	40	29	27	31	44	28	41	44	32	30	38	25
Taffeland	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	7	1	2	0	4	0	5	0	2	4	5
Ederfugl	94	100	107	175	150	175	259	511	289	530	525	375	472	390	510	642	760	818	652	778	1167
Toppet skallesluger	0	0	120	131	129	0	0	0	0	57	50	67	44	73	29	57	50	64	76	60	77
Rørhøg	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
Rørhøne	3	3	3	4	3	0	0	0	0	3	7	4	2	1	0	1	2	2	3	2	0
Blishøne	29	29	25	37	23	0	0	0	0	41	21	37	21	16	20	8	9	15	11	15	20
Strandskade	130	118	131	107	96	95	76	98	113	98	97	91	94	78	74	83	87	84	84	70	83
Vibe	10	4	21	14	15	12	10	17	10	16	13	15	15	21	30	15	14	15	22	13	18
Stor præstekrave	15	13	19	7	9	9	7	8	8	7	4	1	3	5	1	3	0	0	0	0	4
Dobbeltbekkasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødben	18	11	21	19	12	13	13	12	14	10	14	11	12	14	18	10	7	10	11	8	14
Alm. Ryle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Klyde	**78**	**54**	**70**	**85**	**104**	**60**	**31**	**74**	**64**	**32**	**40**	**17**	**59**	**51**	**49**	**47**	**32**	**32**	**34**	**71**	**62**

Bilag 1 – Roskilde Fjord	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sorthovedet måge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Svartbag	32	28	38	29	35	35	30	45	36	38	42	28	35	34	29	40	38	38	31	32	34
Sildemåge	1	2	4	4	3	5	4	4	4	7	5	2	5	6	6	2	4	5	8	4	2
Sølvmåge	1285	1277	657	1356	1731	1883	1676	1864	1620	1845	2154	1016	2248	2387	1761	2325	1565	1445	1505	1710	1852
Stormmåge	2378	2222	1722	1633	2356	1972	790	1680	1463	1466	1116	647	726	503	457	564	535	411	458	334	288
Hættemåge	6116	4706	4871	4877	3549	2367	901	666	621	597	595	87	180	357	363	212	359	265	298	260	90
Rovterne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
Splitterne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjordterne	**247**	**185**	**140**	**125**	**132**	**175**	**78**	**127**	**127**	**105**	**50**	**26**	**47**	**73**	**24**	**61**	**41**	**20**	**26**	**31**	**31**
Havterne	**313**	**243**	**197**	**119**	**227**	**140**	**45**	**127**	**102**	**126**	**88**	**106**	**76**	**76**	**114**	**95**	**58**	**30**	**40**	**28**	**71**
Dværgterne	**8**	**11**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum	11505	9694	8841	9417	9156	7559	4404	5797	4946	5427	5375	3159	4578	4621	4030	4777	4016	3639	3540	3764	4253

Bilag 1 – Roskilde Fjord	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toppet lappedykker	4	14	7	7	6	6	8	6
Gråstrubet lappedykker	0	0	0	0	0	0	0	0
Lille lappedykker	0	0	0	0	0	0	0	0
Skarv	0	0	0	1	0	0	0	1
Knopsvane	129	164	111	138	216	158	180	210
Grågås	22	25	40	11	16	24	18	29
Gråand	71	47	44	47	44	24	49	43
Knarand	14	8	14	15	7	14	12	6
Spidsand	1	1	0	1	0	1	0	1
Pibeand	0	0	0	0	0	0	0	0
Krikand	0	0	0	0	0	0	0	0
Atlingand	1	0	0	0	0	1	0	0
Skeand	12	14	9	15	8	14	6	22
Gravand	88	50	32	29	17	11	18	20
Troldand	20	8	27	29	21	12	13	11
Taffeland	5	7	1	4	2	1	0	0
Ederfugl	823	876	812	645	1.185	879	688	1.157
Toppet skallesluger	79	83	62	0	86	55	47	55
Rørhøg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rørhøne	2	1	3	0	4	2	3	0
Blishøne	22	18	12	11	7	7	11	5
Strandskade	74	70	94	79	83	92	91	94
Vibe	35	63	51	39	45	49	45	47
Stor præstekrave	4	12	14	5	9	13	13	11
Dobbeltbekkasin	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødben	28	41	36	42	51	42	37	38
Alm. Ryle	0	0	0	1	0	0	0	0
Klyde	**94**	**100**	**91**	**69**	**74**	**107**	**110**	**93**
Sorthovedet måge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Bilag 1 – Roskilde Fjord	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Svartbag	31	26	25	20	23	31	30	25
Sildemåge	5	3	6	7	5	4	5	5
Sølvmåge	1766	1914	1930	2031	1.081	1.344	1.050	953
Stormmåge	355	324	207	259	178	274	165	111
Hættemåge	247	116	110	140	425	125	315	466
Rovterne	0	0	1	0	0	1	1	1
Splitterne	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjordterne	**41**	**8**	**35**	**32**	**48**	**57**	**98**	**125**
Havterne	**43**	**13**	**33**	**23**	**61**	**66**	**31**	**73**
Dværgterne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum	4.016	4.006	3.807	3.700	3.702	3.414	3.044	3.609

Bilag 2: *Bestandsudvikling (ynglepar) ved Selsø Sø 1970-2026. Udpegningsarter er vist med* ***fed*** *skrift. Bemærk, at der ikke er data fra 2006. De viste tal er summen af mulige + sandsynlige + sikre ynglepar, dvs. det højest mulige. - = Ikke optalt. Udpegningsarter er vist med* ***fed*** *skrift.*

Bilag 2 – Selsø Sø	1970	1980	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Lille lappedykker	0	1	0	0	0	0	6	2	1	1	1	2	2	1	0	2	0	2	0
Toppet Lappedykker	15	30	30	25	25	35	20	25	25	20	20	15	15	20	19	10	25	20	15
Gråstrubet lappedykker	3	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Sorthalset lappedykker	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Skarv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Knopsvane	10	25	21	10	12	15	15	15	15	17	13	15	6	9	9	15	16	17	12
Grågås	25	30	32	25	35	30	30	21	12	15	17	16	14	8	10	20	23	20	25
Gravand	1	3	2	2	3	2	5	1	1	4	?	1	1	2	2	2	2	2	2
Knarand	0	2	0	0	0	1	1	?	1	1	0	1	1	1	2	1	3	3	3
Gråand	10	10	10	10	17	15	15	15	13	15	16	13	14	16	13	15	17	15	20
Atlingand	1	2	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	3	2
Skeand	1	4	5	6	4	4	3	4	4	5	5	2	4	4	5	5	7	7	4
Taffeland	2	10	5	6	4	4	5	5	5	1	6	4	3	3	2	4	4	6	6
Troldand	1	10	5	5	5	5	5	5	3	4	2	2	2	3	5	4	4	12	10
Toppet skallesluger	1	3	2	1	2	2	2	1	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rørhøg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vandrikse	0	2	0	1	1	2	4	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Rørhøne	10	5	4	5	5	5	7	5	4	6	6	3	4	2	1	2	0	2	2
Blishøne	35	30	10	12	25	35	30	25	20	20	15	15	15	15	15	20	20	20	20
Strandskade	0	0	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1
Klyde	0	2	1	12	4	2	2	2	0	0	0	0	0	20	54	55	66	60	50
Lille præstekrave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St. præstekrave	0	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	3	2	2
Vibe	0	20	5	3	7	5	2	2	3	4	6	4	3	4	4	5	4	6	5
Dobbeltbekkasin	2	5	6	6	10	10	8	7	5	3	6	5	4	3	4	4	4	3	4
Rødben	1	10	7	7	4	4	6	5	5	3	3	3	2	4	4	3	3	4	4

Bilag 2 – Selsø Sø	1970	1980	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Sorthovedet måge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hættemåge	4500	6730	4000	4200	5500	4500	1200	1100	800	600	725	600	440	400	305	352	310	342	320
Stormmåge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	6	2
Sølvmåge	0	0	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Svartbag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjordterne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	13	6	5
Dværgterne	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Engpiber	0	0	0	0	0	6	5	3	5	4	2	1	3	3	3	2	3	1	2
Gul vipstjert	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4
Nattergal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	1
Bynkefugl	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Græshoppesanger	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
Sivsanger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0
Kærsanger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5
Rørsanger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skægmejse	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Rørspurv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilag 2 – Selsø Sø	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lille lappedykker	3	1	2		2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
Toppet Lappedykker	10	16	10		15	8	10	11	8	9	6	6	10	15	15	6	11	15	4	6	5	0	7	2
Gråstrubet lappedykker	3	0	4		0	0	3	4	3	3	3	5	5	5	7	3	5	7	6	1	2	1	1	0
Sorthalset lappedykker	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	1	1	0	1	0	0	1	1
Skarv	0	0	40	153	177	145	121	220	188	305	269	276	310	182	328	350	320	310	295	280	315	285	300	184
Knopsvane	15	16	22		14	10	15	15	10	10	13	13	10	14	15	12	10	8	15	24	22	23	12	21
Grågås	40	34	55		55	28	55	51	47	57	42	40	22	52	58	35	30	25	25	40	38	52	32	48
Gravand	5	2	1		1	4	2	1	1	1	1	5	4	3	4	1	2	3	2	5	3	3	1	1
Knarand	10	5	8		20	9	3	4	10	9	4	6	8	6	9	10	12	8	5	5	4	11	5	10
Gråand	25	22	26		20	15	8	10	10	15	15	15	15	18	12	16	15	15	9	12	10	12	11	14
Atlingand	4	4	4		2	1	4	1	5	3	1	3	2	2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
Skeand	10	5	7		15	5	7	8	10	10	4	6	5	6	8	10	10	13	4	2	4	0	6	6
Taffeland	6	5	5		?	0	4	2	5	5	2	4	3	3	2	5	5	6	2	7	6	3	3	4
Troldand	15	9	20		?	0	10	7	5	5	13	3	3	13	9	5	5	7	4	10	10	11	3	12
Toppet skallesluger	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rørhøg	**1**	**1**	**0**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Vandrikse	1	1	0		0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
Rørhøne	3	1	1		?	1	0	2	0	0	0	1	2	2	2	0	3	5	1	2	1	0	1	1
Blishøne	25	20	20		40	30	15	15	15	20	15	20	20	20	10	15	15	20	8	14	12	6	10	11
Strandskade	2	1	2		1	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	3	3	3	2	0	2	6	2	2
Klyde	**65**	**63**	**80**	**2**	**85**	**56**	**31**	**0**	**0**	**7**	**21**	**20**	**12**	**21**	**11**	**0**	**3**	**0**	**20**	**38**	**36**	**47**	**3**	**15**
Lille præstekrave	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	2
St. præstekrave	3	2	2		1	0	2	0	0	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	0	2	1	2	1
Vibe	7	3	5		4	7	8	4	3	11	8	6	8	9	7	6	5	6	4	11	7	11	3	8
Dobbeltbekkasin	4	4	2		0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rødben	2	4	3		2	1	6	3	3	2	2	4	4	5	2	3	3	3	1	2	0	2	2	2
Sorthovedet måge	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilag 2 – Selsø Sø	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hættemåge	600	480	1040		1400	1300	1000	800	1200	950	925	725	600	700	300	500	500	550	280	210	350	260	150	0
Stormmåge	5	4	4		5	5	2	4	1	2	2	2	1	7	7	4	3	2	0	0	0	2	1	1
Sølvmåge	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
Svartbag	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Fjordterne	**15**	**8**	**6**	**0**	**8**	**4**	**15**	**0**	**5**	**24**	**14**	**25**	**11**	**11**	**16**	**0**	**0**	**0**	**8**	**18**	**12**	**10**	**5**	**4**
Dværgterne	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Engpiber	0	3	2		1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Gul vipstjert	3	3	4		1	1	3	3	2	1	1	2	3	3	2	2	2	2	1	1	3	2	1	2
Nattergal	2	2	2		0	3	1	1	2	2	2	2	3	2	1	2	2	3	3	6	5	2	5	4
Bynkefugl	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Græshoppesanger	1	0	1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	2	0	1	0	0	1	0
Sivsanger	1	4	1		3	6	2	4	9	9	8	13	14	14	13	14	13	10	8	7	7	8	9	11
Kærsanger	3	3	1		3	3	1	2	5	1	4	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	6	5	5
Rørsanger													5	8	8	5	7	5	4	11	12	4	5	7
Skægmejse	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1	1	0	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0
Rørspurv								5	10	5	3	5	8	7	8	5	7	8	5	6	6	5	5	3