

Operationserklæring

På Slangerup Skoles Tandklinik udføres en række forskellige operationer.

- Fjernelse af visdomstænder.
- Fjernelse af overtallige tænder.
- Operationer i forbindelse med tandregulering.
- Transplantationer og implantationer.
- Bløddelsoperationer såsom stramt læbebånd og spyttensfjernelse

Der er ved alle operationer en risiko for komplikationer, de mest almindelige er:

- Efterblødning.
- Ødemer (hævelse).
- Nerveskader.
- Skader på nabotænder.
- Betændelse.

Ad 1. Efter operation er det muligt, at der kommer en efterblødning. Som regel er det ikke et stort problem, da det er forholdsvis let at standse.

Ad 2. Hævelse, som opstår efter en operation, er meget almindeligt. Problemet er kosmetisk, og der er ingen risiko ved det.

Ad 3. Nerveskader efter en operation kan forekomme, men er yderst sjældne. Med nye røntgenoptagelser er vi i stand til at se de store nervers forløb og tage vores forholdsregler. Der er særlig risiko i underkæben ved fjernelse af visdomstænder eller længere fremme i munden ved underkæbens hjørnetænder. Overtallige tænder, som ligger ind over andre tænders rodspidser, kan give problemer med hensyn til nerverne i den tand, som den overtallige tand ligger op af. Nogle gange lader vi den overtallige tand ligge, hvis den skønnes ikke at lave skader. Ovenstående skader er meget sjældne.

Ad 4. Der vil kunne opstå skade på nabotænder ved fjernelse af en tand. Men dette forekommer sjældent.

Ad 5. Efter operation kan der i sjældne tilfælde opstå betændelse. Vi stræber efter meget høj hygiejne og ser derfor sjældent betændelse efter operation. Betændelse afhjælpes med penicillin eller anden antibiotika.

Komplikationer efter operation i kæben er yderst sjældne. Der vil altid gives mundtlig information inden en operation.

Undertegnede er informeret om, at ovenstående komplikationer kan opstå i forbindelse med operation.

Navn:

Cpr.nr.:

Adresse:

Dato:

Patient/værge (underskrift):

